

表 136 2016年導入患者死亡原因分類(性別との関係)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全 (%)	324 (21.4)	174 (23.5)	498 (22.1)		498 (22.1)
脳血管障害 (%)	79 (5.2)	54 (7.3)	133 (5.9)		133 (5.9)
感染症 (%)	415 (27.4)	180 (24.4)	595 (26.4)		595 (26.4)
消化管出血 (%)	30 (2.0)	18 (2.4)	48 (2.1)		48 (2.1)
悪性腫瘍 (%)	192 (12.7)	82 (11.1)	274 (12.2)		274 (12.2)
悪液質/尿毒症 (%)	68 (4.5)	30 (4.1)	98 (4.4)		98 (4.4)
心筋梗塞 (%)	49 (3.2)	17 (2.3)	66 (2.9)		66 (2.9)
カリウム中毒/頓死 (%)	20 (1.3)	8 (1.1)	28 (1.2)		28 (1.2)
肝硬変症 (%)	24 (1.6)	15 (2.0)	39 (1.7)		39 (1.7)
自殺/拒否 (%)	16 (1.1)	4 (0.5)	20 (0.9)		20 (0.9)
腸閉塞 (%)	13 (0.9)	13 (1.8)	26 (1.2)		26 (1.2)
肺血栓/肺塞栓 (%)	4 (0.3)	2 (0.3)	6 (0.3)		6 (0.3)
災害・事故死 (%)	3 (0.2)		3 (0.1)		3 (0.1)
その他 (%)	152 (10.0)	94 (12.7)	246 (10.9)		246 (10.9)
不明 (%)	124 (8.2)	48 (6.5)	172 (7.6)		172 (7.6)
合計 (%)	1,513 (100.0)	739 (100.0)	2,252 (100.0)		2,252 (100.0)
記載なし					
総計	1,513	739	2,252		2,252

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

#A0071##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査