

表 139 2016年導入患者死亡原因分類(原疾患との関係)

| 原疾患                  | 心不全           | 脳血管障害        | 感染症           | 消化管出血       | 悪性腫瘍          | 悪液質<br>/尿毒症 | 心筋梗塞        | カリウム<br>中毒/頓死 | 肝硬変症        | 自殺/拒否       | 腸閉塞         | 肺血栓<br>/肺塞栓 | 災害<br>・事故死 | その他           | 不明           | 合計               | 記載なし | 総計    |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|--------------|------------------|------|-------|
| 慢性糸球体腎炎<br>(%)       | 74<br>(22.9)  | 14<br>(4.3)  | 92<br>(28.5)  | 6<br>(1.9)  | 34<br>(10.5)  | 14<br>(4.3) | 4<br>(1.2)  | 3<br>(0.9)    | 9<br>(2.8)  | 1<br>(0.3)  | 3<br>(0.9)  | 2<br>(0.6)  | 1<br>(0.3) | 47<br>(14.6)  | 19<br>(5.9)  | 323<br>(100.0)   |      | 323   |
| 慢性腎盂腎炎<br>(%)        | 4<br>(22.2)   |              | 5<br>(27.8)   |             | 6<br>(33.3)   | 1<br>(5.6)  |             |               |             |             |             |             |            | 1<br>(5.6)    | 1<br>(5.6)   | 18<br>(100.0)    |      | 18    |
| 急速進行性糸球体腎炎<br>(%)    | 7<br>(9.6)    | 3<br>(4.1)   | 34<br>(46.6)  | 3<br>(4.1)  | 4<br>(5.5)    | 6<br>(8.2)  |             |               | 1<br>(1.4)  |             | 1<br>(1.4)  | 1<br>(1.4)  |            | 10<br>(13.7)  | 3<br>(4.1)   | 73<br>(100.0)    |      | 73    |
| 妊娠腎/妊娠中毒症<br>(%)     |               |              |               |             |               |             |             |               |             |             |             |             |            |               |              |                  |      |       |
| その他の分類不能の腎炎<br>(%)   | 1<br>(7.1)    | 1<br>(7.1)   | 5<br>(35.7)   |             | 3<br>(21.4)   | 1<br>(7.1)  |             |               |             |             |             |             |            | 2<br>(14.3)   | 1<br>(7.1)   | 14<br>(100.0)    |      | 14    |
| 多発性嚢胞腎<br>(%)        | 3<br>(10.7)   | 3<br>(10.7)  | 7<br>(25.0)   | 1<br>(3.6)  | 6<br>(21.4)   | 3<br>(10.7) |             |               | 1<br>(3.6)  |             |             |             |            | 2<br>(7.1)    | 2<br>(7.1)   | 28<br>(100.0)    |      | 28    |
| 腎硬化症<br>(%)          | 68<br>(22.8)  | 26<br>(8.7)  | 81<br>(27.2)  | 4<br>(1.3)  | 33<br>(11.1)  | 16<br>(5.4) | 10<br>(3.4) | 6<br>(2.0)    | 1<br>(0.3)  | 5<br>(1.7)  | 3<br>(1.0)  |             |            | 29<br>(9.7)   | 16<br>(5.4)  | 298<br>(100.0)   |      | 298   |
| 悪性高血圧<br>(%)         | 3<br>(27.3)   | 1<br>(9.1)   |               | 1<br>(9.1)  | 2<br>(18.2)   | 1<br>(9.1)  |             |               | 1<br>(9.1)  |             |             |             |            | 2<br>(18.2)   |              | 11<br>(100.0)    |      | 11    |
| 糖尿病性腎症<br>(%)        | 151<br>(23.7) | 52<br>(8.2)  | 153<br>(24.0) | 12<br>(1.9) | 55<br>(8.6)   | 27<br>(4.2) | 29<br>(4.5) | 11<br>(1.7)   | 6<br>(0.9)  | 9<br>(1.4)  | 10<br>(1.6) |             | 2<br>(0.3) | 65<br>(10.2)  | 56<br>(8.8)  | 638<br>(100.0)   |      | 638   |
| SLE腎炎<br>(%)         | 8<br>(32.0)   | 1<br>(4.0)   | 8<br>(32.0)   | 1<br>(4.0)  | 2<br>(8.0)    |             | 2<br>(8.0)  | 1<br>(4.0)    |             |             |             |             |            | 1<br>(4.0)    | 1<br>(4.0)   | 25<br>(100.0)    |      | 25    |
| アミロイド腎<br>(%)        | 5<br>(27.8)   |              | 5<br>(27.8)   |             | 2<br>(11.1)   |             |             |               | 1<br>(5.6)  |             |             |             |            | 3<br>(16.7)   | 2<br>(11.1)  | 18<br>(100.0)    |      | 18    |
| 痛風腎<br>(%)           | 1<br>(50.0)   |              |               |             |               | 1<br>(50.0) |             |               |             |             |             |             |            |               |              | 2<br>(100.0)     |      | 2     |
| 先天性代謝異常による腎不全<br>(%) | 1<br>(50.0)   |              | 1<br>(50.0)   |             |               |             |             |               |             |             |             |             |            |               |              | 2<br>(100.0)     |      | 2     |
| 腎・尿路結核<br>(%)        |               |              |               |             |               |             |             |               |             |             |             |             |            |               |              |                  |      |       |
| 腎・尿路結石<br>(%)        | 1<br>(25.0)   |              | 1<br>(25.0)   |             | 2<br>(50.0)   |             |             |               |             |             |             |             |            |               |              | 4<br>(100.0)     |      | 4     |
| 腎・尿路腫瘍<br>(%)        |               |              | 1<br>(6.3)    |             | 14<br>(87.5)  |             |             |               |             |             |             | 1<br>(6.3)  |            |               |              | 16<br>(100.0)    |      | 16    |
| 閉塞性尿路障害<br>(%)       |               |              | 2<br>(15.4)   |             | 8<br>(61.5)   |             | 1<br>(7.7)  |               |             |             | 1<br>(7.7)  |             |            | 1<br>(7.7)    |              | 13<br>(100.0)    |      | 13    |
| 骨髄腫<br>(%)           | 2<br>(6.3)    | 1<br>(3.1)   | 4<br>(12.5)   | 1<br>(3.1)  | 21<br>(65.6)  | 2<br>(6.3)  |             |               |             |             |             |             |            | 1<br>(3.1)    |              | 32<br>(100.0)    |      | 32    |
| 腎形成不全<br>(%)         | 1<br>(100.0)  |              |               |             |               |             |             |               |             |             |             |             |            |               |              | 1<br>(100.0)     |      | 1     |
| 不明<br>(%)            | 117<br>(24.2) | 24<br>(5.0)  | 116<br>(24.0) | 12<br>(2.5) | 56<br>(11.6)  | 22<br>(4.5) | 15<br>(3.1) | 5<br>(1.0)    | 11<br>(2.3) | 3<br>(0.6)  | 3<br>(0.6)  | 1<br>(0.2)  |            | 44<br>(9.1)   | 55<br>(11.4) | 484<br>(100.0)   |      | 484   |
| 再導入<br>(%)           | 5<br>(27.8)   | 2<br>(11.1)  | 5<br>(27.8)   | 1<br>(5.6)  | 1<br>(5.6)    |             |             |               |             |             |             |             |            | 3<br>(16.7)   | 1<br>(5.6)   | 18<br>(100.0)    |      | 18    |
| その他<br>(%)           | 46<br>(19.7)  | 5<br>(2.1)   | 75<br>(32.1)  | 6<br>(2.6)  | 25<br>(10.7)  | 4<br>(1.7)  | 5<br>(2.1)  | 2<br>(0.9)    | 8<br>(3.4)  | 2<br>(0.9)  | 5<br>(2.1)  | 1<br>(0.4)  |            | 35<br>(15.0)  | 15<br>(6.4)  | 234<br>(100.0)   |      | 234   |
| 合計<br>(%)            | 498<br>(22.1) | 133<br>(5.9) | 595<br>(26.4) | 48<br>(2.1) | 274<br>(12.2) | 98<br>(4.4) | 66<br>(2.9) | 28<br>(1.2)   | 39<br>(1.7) | 20<br>(0.9) | 26<br>(1.2) | 6<br>(0.3)  | 3<br>(0.1) | 246<br>(10.9) | 172<br>(7.6) | 2,252<br>(100.0) |      | 2,252 |
| 記載なし<br>(%)          |               |              |               |             |               |             |             |               |             |             |             |             |            |               |              |                  |      |       |
| 総計<br>(%)            | 498<br>(22.1) | 133<br>(5.9) | 595<br>(26.4) | 48<br>(2.1) | 274<br>(12.2) | 98<br>(4.4) | 66<br>(2.9) | 28<br>(1.2)   | 39<br>(1.7) | 20<br>(0.9) | 26<br>(1.2) | 6<br>(0.3)  | 3<br>(0.1) | 246<br>(10.9) | 172<br>(7.6) | 2,252<br>(100.0) |      | 2,252 |

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

##A0074##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査