

表 142 2016年導入患者死亡原因分類(年齢別,原疾患別)原疾患=急速進行性糸球体腎炎

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)												1 (50.0)		1 (12.5)	1 (11.1)		2 (11.1)	2 (13.3)			7 (9.6)			7 (9.6)	77.00	11.52
脳血管障害 (%)																		3 (20.0)			3 (4.1)			3 (4.1)	86.00	1.73
感染症 (%)												2 (66.7)	2 (25.0)	2 (25.0)	4 (44.4)	6 (66.7)	10 (55.6)	6 (40.0)	3 (42.9)	1 (50.0)	34 (46.6)			34 (46.6)	80.21	8.10
消化管出血 (%)												1 (33.3)					1 (5.6)		1 (14.3)		3 (4.1)			3 (4.1)	79.33	14.84
悪性腫瘍 (%)												1 (50.0)		2 (25.0)			1 (5.6)				4 (5.5)			4 (5.5)	68.50	10.47
悪液質/尿毒症 (%)															1 (11.1)	1 (11.1)	1 (5.6)	2 (13.3)	1 (14.3)		6 (8.2)			6 (8.2)	82.67	7.61
心筋梗塞 (%)																										
カリウム中毒/頓死 (%)																										
肝硬変症 (%)														1 (12.5)							1 (1.4)			1 (1.4)	67.00	
自殺/拒否 (%)																										
腫瘍塞 (%)															1 (11.1)						1 (1.4)			1 (1.4)	71.00	
肺血栓/肺塞栓 (%)																				1 (50.0)	1 (1.4)			1 (1.4)	95.00	
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)														1 (12.5)	2 (22.2)	2 (22.2)	3 (16.7)	1 (6.7)	1 (14.3)		10 (13.7)			10 (13.7)	78.80	7.39
不明 (%)														1 (12.5)				1 (6.7)	1 (14.3)		3 (4.1)			3 (4.1)	82.67	11.93
合計 (%)												2 (100.0)	3 (100.0)	8 (100.0)	9 (100.0)	9 (100.0)	18 (100.0)	15 (100.0)	7 (100.0)	2 (100.0)	73 (100.0)			73 (100.0)	79.47	9.16
記載なし																										
総計												2	3	8	9	9	18	15	7	2	73			73	79.47	9.16

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
##A0077##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査