

表 146 2016年導入患者死亡原因分類(年齢別,原疾患別)原疾患=腎硬化症

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)												1 (25.0)			6 (46.2)	12 (23.5)	25 (23.4)	17 (22.7)	7 (25.0)		68 (22.8)			68 (22.8)	82.24	6.06
脳血管障害 (%)												1 (25.0)		2 (18.2)		6 (11.8)	10 (9.3)	6 (8.0)		1 (20.0)	26 (8.7)			26 (8.7)	80.27	7.95
感染症 (%)												1 (25.0)			4 (30.8)	14 (27.5)	32 (29.9)	22 (29.3)	6 (21.4)	2 (40.0)	81 (27.2)			81 (27.2)	82.91	5.98
消化管出血 (%)														1 (9.1)			3 (2.8)				4 (1.3)			4 (1.3)	78.00	8.16
悪性腫瘍 (%)													1 (50.0)	5 (45.5)	1 (7.7)	7 (13.7)	11 (10.3)	5 (6.7)	3 (10.7)		33 (11.1)			33 (11.1)	79.48	7.54
悪液質/尿毒症 (%)											1 (50.0)					1 (2.0)	3 (2.8)	5 (6.7)	6 (21.4)		16 (5.4)			16 (5.4)	85.25	9.43
心筋梗塞 (%)															1 (7.7)	2 (1.9)	4 (5.3)	1 (3.6)		2 (40.0)	10 (3.4)			10 (3.4)	87.10	7.40
カリウム中毒/頓死 (%)											1 (50.0)	1 (25.0)		1 (9.1)		1 (2.0)	1 (0.9)	1 (1.3)			6 (2.0)			6 (2.0)	70.83	14.47
肝硬変症 (%)																1 (2.0)					1 (0.3)			1 (0.3)	75.00	
自殺/拒否 (%)																2 (3.9)	3 (2.8)				5 (1.7)			5 (1.7)	80.20	2.17
腫瘍塞 (%)																	1 (0.9)	2 (2.7)			3 (1.0)			3 (1.0)	84.67	1.53
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)															1 (7.7)	4 (7.8)	10 (9.3)	10 (13.3)	4 (14.3)		29 (9.7)			29 (9.7)	83.79	4.78
不明 (%)													1 (50.0)	2 (18.2)		3 (5.9)	6 (5.6)	3 (4.0)	1 (3.6)		16 (5.4)			16 (5.4)	79.31	7.45
合計 (%)											2 (100.0)	4 (100.0)	2 (100.0)	11 (100.0)	13 (100.0)	51 (100.0)	107 (100.0)	75 (100.0)	28 (100.0)	5 (100.0)	298 (100.0)			298 (100.0)	81.94	7.15
記載なし																										
総計											2	4	2	11	13	51	107	75	28	5	298			298	81.94	7.15

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0081##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査