

表 149 2016年導入患者死亡原因分類(年齢別、原疾患別)原疾患 = SLE腎炎

死因	5歳未満	5歳~	10歳~	15歳~	20歳~	25歳~	30歳~	35歳~	40歳~	45歳~	50歳~	55歳~	60歳~	65歳~	70歳~	75歳~	80歳~	85歳~	90歳~	95歳~	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差			
心不全 (%)										1 (50.0)				3 (60.0)		1 (50.0)	2 (100.0)	1 (20.0)	1 (25.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (100.0)	2 (100.0)	1 (100.0)	8 (32.0)		8 (32.0)	76.50	14.97
脳血管障害 (%)										1 (50.0)				2 (50.0)		2 (50.0)	1 (100.0)	1 (20.0)	1 (25.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (100.0)	2 (100.0)	1 (100.0)	1 (40.0)	1 (40.0)	1 (40.0)	49.00	
感染症 (%)																					8 (32.0)	8 (32.0)	8 (32.0)	68.38	7.27				
消化管出血 (%)																					1 (4.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	74.00					
悪性腫瘍 (%)																					2 (8.0)	2 (8.0)	2 (8.0)	73.00	7.07				
悪液質/尿毒症 (%)																					2 (8.0)	2 (8.0)	2 (8.0)	79.50	6.36				
心筋梗塞 (%)																					1 (4.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	68.00					
カリウム中毒/頻死 (%)																					2 (8.0)	2 (8.0)	2 (8.0)	79.50					
肝硬変症 (%)																					1 (4.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	68.00					
自殺/拒否 (%)																					1 (4.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	68.00					
腸閉塞 (%)																					2 (8.0)	2 (8.0)	2 (8.0)	79.50					
肺血栓/肺塞栓 (%)																					1 (4.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	68.00					
災害・事故死 (%)																					1 (4.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	68.00					
その他 (%)																					1 (4.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	68.00					
不明 (%)																					1 (4.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	68.00					
合計 (%)										2 (100.0)				2 (100.0)		2 (100.0)	4 (100.0)	5 (100.0)	5 (100.0)	2 (100.0)	2 (100.0)	1 (100.0)	25 (100.0)		25 (100.0)	71.56	11.63		
記載なし																													
総計										2				2		2	4	5	5	2	2	1	25		25	71.56	11.63		

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A084##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査