

表 159 2016年導入患者死亡原因分類(年齢別、原疾患別)原疾患 = 不明

死因	5歳未満	5歳~	10歳~	15歳~	20歳~	25歳~	30歳~	35歳~	40歳~	45歳~	50歳~	55歳~	60歳~	65歳~	70歳~	75歳~	80歳~	85歳~	90歳~	95歳~	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差			
心不全 (%)									1		2	2	11	16	18	31	27	7	2	117	117	79.44	8.56						
脳血管障害 (%)									1	1	1	1	3	2	2	7	4	1	1	24	(24.2)	24	76.13	13.39					
感染症 (%)									(100.0)	(50.0)	(20.0)	(20.0)	(5.0)	(6.5)	(2.9)	(2.4)	(6.0)	(4.5)	(2.8)	(12.5)	(5.0)	(5.0)	116	78.21	10.08				
消化管出血 (%)											1	1	(35.0)	(21.7)	(23.2)	(28.0)	(19.8)	(23.9)	(30.6)	(25.0)	(24.0)				(24.0)				
悪性腫瘍 (%)											(16.7)	(20.0)	(1.0)	(3.0)	(2.9)	(2.4)	(2.6)	(2.3)	(2.8)					12	76.42	11.67			
悪液質/尿毒症 (%)												(20.0)	(15.0)	(26.1)	(14.5)	(9.8)	(11.2)	(6.8)	(8.3)					56	76.16	8.31			
カリウム中毒/頻死 (%)												(20.0)	(5.0)	(4.3)	(4.3)	(3.7)	(8.6)	(2.3)	(2.8)					22	78.77	7.26			
心筋梗塞 (%)													(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)						(4.5)				
肝硬変症 (%)													(20.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)						15	79.93	11.93		
自殺/拒否 (%)													(20.0)	(16.7)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)						5	79.00	7.42		
腸閉塞 (%)														(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)						11	68.64	12.00		
肺血栓/肺塞栓 (%)														(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)						3	77.00	2.65		
災害・事故死 (%)															(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)						3	(0.6)			
その他 (%)																(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)						3	88.67	7.23	
不明 (%)																									(0.6)				
合計 (%)									1	2	5	6	5	20	46	69	82	116	88	36	8	484			484	78.19	9.77		
記載なし																									(100.0)				
総計																									484	78.19	9.77		

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A094##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2016年調査