

表 161 2016年導入患者死亡原因分類(年齢別、原疾患別)原疾患 = その他

死因	5歳未満	5歳~	10歳~	15歳~	20歳~	25歳~	30歳~	35歳~	40歳~	45歳~	50歳~	55歳~	60歳~	65歳~	70歳~	75歳~	80歳~	85歳~	90歳~	95歳~	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)										2 (33.3)	3 (60.0)	4 (14.3)	3 (10.7)	6 (12.8)	13 (23.2)	11 (31.4)	4 (40.0)	46 (19.7)			46 (19.7)		78.39	11.24		
脳血管障害 (%)										1 (12.5)	1 (37.5)	1 (20.0)	2 (22.2)	8 (28.6)	9 (32.1)	14 (29.8)	19 (33.9)	2 (37.1)	1 (40.0)	1 (100.0)	5 (32.1)	5 (2.1)	5 (2.1)	5 (2.1)	72.00	13.55
感染症 (%)										1 (16.7)	3 (37.5)	1 (20.0)	2 (22.2)	8 (28.6)	9 (32.1)	14 (29.8)	19 (33.9)	13 (37.1)	4 (40.0)	1 (100.0)	75 (32.1)	75 (2.1)	75 (2.1)	75 (2.1)	77.40	10.01
消化管出血 (%)										1 (16.7)	3 (37.5)	1 (20.0)	2 (22.2)	8 (28.6)	9 (32.1)	14 (29.8)	19 (33.9)	2 (37.1)	1 (40.0)	1 (100.0)	6 (32.1)	6 (2.1)	6 (2.1)	6 (2.1)	77.17	7.99
悪性腫瘍 (%)										1 (16.7)	3 (37.5)	1 (20.0)	2 (22.2)	8 (28.6)	9 (32.1)	14 (29.8)	19 (33.9)	2 (37.1)	1 (40.0)	1 (100.0)	25 (32.1)	25 (2.1)	25 (2.1)	25 (2.1)	70.28	8.70
悪液質/尿毒症 (%)										1 (16.7)	3 (37.5)	1 (20.0)	2 (22.2)	8 (28.6)	9 (32.1)	14 (29.8)	19 (33.9)	2 (37.1)	1 (40.0)	1 (100.0)	4 (32.1)	4 (10.7)	4 (10.7)	4 (10.7)	78.25	7.14
心筋梗塞 (%)										1 (16.7)	3 (37.5)	1 (20.0)	2 (22.2)	8 (28.6)	9 (32.1)	14 (29.8)	19 (33.9)	2 (37.1)	1 (40.0)	1 (100.0)	4 (32.1)	4 (1.7)	4 (1.7)	4 (1.7)	76.60	8.65
カリウム中毒/頻死 (%)										1 (16.7)	3 (37.5)	1 (20.0)	2 (22.2)	8 (28.6)	9 (32.1)	14 (29.8)	19 (33.9)	2 (37.1)	1 (40.0)	1 (100.0)	5 (32.1)	5 (2.1)	5 (2.1)	5 (2.1)	71.00	
肝硬変症 (%)										1 (16.7)	3 (37.5)	1 (20.0)	2 (22.2)	8 (28.6)	9 (32.1)	14 (29.8)	19 (33.9)	2 (37.1)	1 (40.0)	1 (100.0)	2 (32.1)	2 (0.9)	2 (0.9)	2 (0.9)	70.88	11.70
自殺/拒否 (%)										1 (16.7)	3 (37.5)	1 (20.0)	2 (22.2)	8 (28.6)	9 (32.1)	14 (29.8)	19 (33.9)	2 (37.1)	1 (40.0)	1 (100.0)	8 (32.1)	8 (3.4)	8 (3.4)	8 (3.4)	79.50	3.54
腸閉塞 (%)										1 (16.7)	3 (37.5)	1 (20.0)	2 (22.2)	8 (28.6)	9 (32.1)	14 (29.8)	19 (33.9)	2 (37.1)	1 (40.0)	1 (100.0)	5 (32.1)	5 (0.9)	5 (0.9)	5 (0.9)	79.80	5.89
肺血栓/肺塞栓 (%)										1 (16.7)	3 (37.5)	1 (20.0)	2 (22.2)	8 (28.6)	9 (32.1)	14 (29.8)	19 (33.9)	2 (37.1)	1 (40.0)	1 (100.0)	1 (32.1)	1 (2.1)	1 (2.1)	1 (2.1)	84.00	
災害・事故死 (%)										1 (16.7)	3 (37.5)	1 (20.0)	2 (22.2)	8 (28.6)	9 (32.1)	14 (29.8)	19 (33.9)	2 (37.1)	1 (40.0)	1 (100.0)	0.4 (0.4)	0.4 (0.4)	0.4 (0.4)	0.4 (0.4)		
その他 (%)										1 (16.7)	3 (37.5)	1 (20.0)	2 (22.2)	8 (28.6)	9 (32.1)	14 (29.8)	19 (33.9)	2 (37.1)	1 (40.0)	1 (100.0)	35 (32.1)	35 (15.0)	35 (15.0)	35 (15.0)	75.46	10.64
不明 (%)	1 (100.0)									2 (33.3)	3 (37.5)	1 (20.0)	2 (22.2)	8 (28.6)	9 (32.1)	14 (29.8)	19 (33.9)	2 (37.1)	1 (40.0)	1 (100.0)	15 (32.1)	15 (6.4)	15 (6.4)	15 (6.4)	70.20	22.51
合計	1 (100.0)									6 (100.0)	8 (100.0)	5 (100.0)	9 (100.0)	28 (100.0)	28 (100.0)	47 (100.0)	56 (100.0)	35 (100.0)	10 (100.0)	1 (100.0)	234 (100.0)			234 (100.0)	75.78	11.49
記載なし										6 (100.0)	8 (100.0)	5 (100.0)	9 (100.0)	28 (100.0)	28 (100.0)	47 (100.0)	56 (100.0)	35 (100.0)	10 (100.0)	1 (100.0)	234 (100.0)			234 (100.0)	75.78	11.49
総計	1									6 (100.0)	8 (100.0)	5 (100.0)	9 (100.0)	28 (100.0)	28 (100.0)	47 (100.0)	56 (100.0)	35 (100.0)	10 (100.0)	1 (100.0)	234 (100.0)			234 (100.0)	75.78	11.49

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0096##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2016年調査