

表 212 2016年末患者、性別、原疾患別

原疾患	男性	女性	合計	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	55,309 (26.9)	36,474 (32.2)	91,783 (28.8)		91,783 (28.8)
慢性腎孟腎炎 (%)	1,351 (0.7)	1,545 (1.4)	2,896 (0.9)		2,896 (0.9)
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1,301 (0.6)	1,237 (1.1)	2,538 (0.8)		2,538 (0.8)
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)		1,483 (1.3)	1,483 (0.5)		1,483 (0.5)
その他の分類不能の腎炎 (%)	869 (0.4)	585 (0.5)	1,454 (0.5)		1,454 (0.5)
多発性囊胞腎 (%)	6,270 (3.0)	5,201 (4.6)	11,471 (3.6)		11,471 (3.6)
腎硬化症 (%)	21,085 (10.2)	10,565 (9.3)	31,650 (9.9)		31,650 (9.9)
悪性高血圧 (%)	1,848 (0.9)	873 (0.8)	2,721 (0.9)		2,721 (0.9)
糖尿病性腎症 (%)	87,441 (42.5)	36,216 (32.0)	123,657 (38.8)		123,657 (38.8)
SLE腎炎 (%)	713 (0.3)	1,509 (1.3)	2,222 (0.7)		2,222 (0.7)
アミロイド腎 (%)	181 (0.1)	257 (0.2)	438 (0.1)		438 (0.1)
痛風腎 (%)	923 (0.4)	133 (0.1)	1,056 (0.3)		1,056 (0.3)
先天性代謝異常による腎不全 (%)	170 (0.1)	111 (0.1)	281 (0.1)		281 (0.1)
腎・尿路結核 (%)	85 (0.0)	83 (0.1)	168 (0.1)		168 (0.1)
腎・尿路結石 (%)	381 (0.2)	197 (0.2)	578 (0.2)		578 (0.2)
腎・尿路腫瘍 (%)	742 (0.4)	217 (0.2)	959 (0.3)		959 (0.3)
閉塞性尿路障害 (%)	490 (0.2)	253 (0.2)	743 (0.2)		743 (0.2)
骨髄腫 (%)	192 (0.1)	131 (0.1)	323 (0.1)		323 (0.1)
腎形成不全 (%)	414 (0.2)	250 (0.2)	664 (0.2)		664 (0.2)
不明 (%)	19,510 (9.5)	11,901 (10.5)	31,411 (9.8)	1 (100.0)	31,412 (9.8)
再導入 (%)	1,428 (0.7)	746 (0.7)	2,174 (0.7)		2,174 (0.7)
その他 (%)	5,220 (2.5)	3,218 (2.8)	8,438 (2.6)		8,438 (2.6)
合計 (%)	205,923 (100.0)	113,185 (100.0)	319,108 (100.0)	1 (100.0)	319,109 (100.0)
記載なし					
総計	205,923	113,185	319,108	1	319,109

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0147##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査