

表 217 2016年末患者、年齢、原疾患別人数(男性)

原疾患	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	1 (7.1)	3 (18.8)		10 (18.5)	28 (21.1)	140 (33.7)	388 (35.6)	825 (33.0)	1,748 (30.4)	2,910 (28.9)	3,555 (26.9)	4,609 (27.4)	6,915 (28.7)	10,726 (26.8)	8,173 (25.2)	7,173 (23.4)	5,017 (23.8)	2,418 (23.8)	607 (23.8)	63 (24.4)	55,309 (26.9)			55,309 (26.9)	66.53	12.44
慢性腎盂腎炎 (%)				1 (1.9)	5 (3.8)	7 (1.7)	21 (1.9)	37 (1.5)	73 (1.3)	87 (0.9)	97 (0.7)	104 (0.6)	129 (0.5)	242 (0.6)	175 (0.6)	170 (0.6)	122 (0.6)	62 (0.6)	19 (0.7)		1,351 (0.7)			1,351 (0.7)	64.80	14.26
急速進行性糸球体腎炎 (%)					1 (0.8)	7 (1.7)	9 (0.8)	17 (0.7)	40 (0.7)	50 (0.5)	48 (0.4)	77 (0.5)	134 (0.6)	245 (0.6)	218 (0.7)	212 (0.7)	150 (0.7)	75 (0.7)	15 (0.6)	3 (1.2)	1,301 (0.6)			1,301 (0.6)	68.66	12.42
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)																										
その他の分類不能の腎炎 (%)	1 (7.1)	1 (6.3)	2 (11.8)	9 (16.7)	10 (7.5)	19 (4.6)	31 (2.8)	54 (2.2)	60 (1.0)	73 (0.7)	69 (0.5)	66 (0.4)	82 (0.3)	130 (0.3)	82 (0.3)	83 (0.3)	65 (0.3)	20 (0.2)	11 (0.4)	1 (0.4)	869 (0.4)			869 (0.4)	59.35	16.98
多発性嚢胞腎 (%)	3 (21.4)	1 (6.3)	1 (5.8)		4 (3.0)	7 (1.7)	16 (1.5)	62 (2.5)	200 (3.5)	420 (4.2)	608 (4.6)	792 (4.7)	937 (3.9)	1,203 (3.1)	777 (2.5)	615 (2.2)	408 (1.9)	168 (1.7)	45 (1.8)	3 (1.2)	6,270 (3.0)			6,270 (3.0)	64.24	11.69
腎硬化症 (%)				2 (3.7)	6 (4.5)	18 (4.3)	55 (5.1)	126 (5.0)	325 (5.6)	573 (5.7)	709 (5.4)	929 (5.5)	1,433 (6.0)	2,836 (7.4)	2,998 (9.8)	3,789 (13.3)	3,988 (18.6)	2,460 (24.2)	750 (29.4)	88 (34.1)	21,085 (10.2)			21,085 (10.2)	73.21	11.89
悪性高血圧 (%)					2 (1.5)	8 (1.9)	27 (2.5)	70 (2.8)	143 (2.5)	182 (1.8)	184 (1.4)	187 (1.1)	173 (0.7)	257 (0.6)	190 (0.6)	171 (0.6)	149 (0.7)	80 (0.8)	25 (1.0)		1,848 (0.9)			1,848 (0.9)	62.12	14.64
糖尿病性腎症 (%)				1 (1.9)	2 (1.5)	12 (2.9)	182 (16.7)	716 (28.6)	2,111 (36.7)	4,261 (42.3)	6,113 (46.3)	7,933 (47.2)	11,264 (46.8)	17,958 (46.7)	13,743 (45.0)	11,852 (41.7)	7,846 (36.7)	2,878 (28.3)	531 (20.8)	38 (14.7)	87,441 (42.5)			87,441 (42.5)	66.86	11.21
SLE腎炎 (%)				3 (5.6)	3 (2.3)	12 (2.9)	17 (1.6)	23 (0.9)	36 (0.6)	53 (0.5)	64 (0.5)	58 (0.3)	71 (0.3)	118 (0.3)	84 (0.3)	79 (0.3)	61 (0.3)	27 (0.3)	4 (0.2)		713 (0.3)			713 (0.3)	62.69	15.01
アミロイド腎 (%)							1 (0.1)	3 (0.1)	8 (0.1)	15 (0.1)	14 (0.1)	13 (0.1)	24 (0.1)	27 (0.1)	31 (0.1)	26 (0.1)	11 (0.1)	7 (0.1)		1 (0.4)	181 (0.1)			181 (0.1)	65.30	12.61
痛風腎 (%)						1 (0.2)	4 (0.4)	5 (0.2)	21 (0.4)	32 (0.3)	61 (0.5)	65 (0.4)	101 (0.4)	184 (0.5)	170 (0.6)	164 (0.6)	77 (0.4)	30 (0.3)	7 (0.3)	1 (0.4)	923 (0.4)			923 (0.4)	68.06	11.03
先天性代謝異常による腎不全 (%)	1 (7.1)			4 (7.4)	10 (7.5)	11 (2.7)	10 (0.9)	17 (0.7)	24 (0.4)	19 (0.2)	12 (0.1)	9 (0.1)	16 (0.1)	18 (0.0)	3 (0.0)	7 (0.0)	5 (0.0)	3 (0.0)	1 (0.0)		170 (0.1)			170 (0.1)	48.82	17.68
腎・尿路結核 (%)										1 (0.0)	1 (0.0)	3 (0.0)	7 (0.0)	20 (0.1)	19 (0.1)	12 (0.1)	11 (0.1)	7 (0.1)	4 (0.2)		85 (0.0)			85 (0.0)	73.21	8.97
腎・尿路結石 (%)									4 (0.1)	10 (0.1)	13 (0.1)	33 (0.2)	36 (0.1)	60 (0.2)	67 (0.2)	76 (0.3)	55 (0.3)	22 (0.2)	5 (0.2)		381 (0.2)			381 (0.2)	70.99	10.38
腎・尿路腫瘍 (%)						2 (0.5)	1 (0.1)	4 (0.2)	7 (0.1)	13 (0.1)	18 (0.1)	32 (0.2)	71 (0.3)	128 (0.3)	133 (0.4)	137 (0.5)	125 (0.6)	55 (0.5)	15 (0.6)	1 (0.4)	742 (0.4)			742 (0.4)	72.18	10.57
閉塞性尿路障害 (%)		1 (6.3)			1 (0.8)	5 (1.2)	5 (0.5)	28 (1.1)	25 (0.4)	35 (0.3)	31 (0.2)	20 (0.1)	29 (0.1)	82 (0.2)	70 (0.2)	69 (0.3)	56 (0.3)	30 (0.3)	3 (0.1)		490 (0.2)			490 (0.2)	65.32	15.46
骨髄腫 (%)								1 (0.0)	2 (0.0)	5 (0.0)	12 (0.1)	5 (0.0)	17 (0.1)	35 (0.1)	34 (0.1)	38 (0.1)	19 (0.1)	21 (0.2)	3 (0.1)		192 (0.1)			192 (0.1)	71.46	11.02
腎形成不全 (%)	5 (35.7)	6 (37.5)	10 (58.8)	10 (18.5)	17 (12.8)	30 (7.2)	43 (3.9)	62 (2.5)	50 (0.9)	51 (0.5)	25 (0.2)	17 (0.1)	22 (0.1)	21 (0.1)	12 (0.0)	16 (0.1)	14 (0.1)	2 (0.0)	1 (0.0)		414 (0.2)			414 (0.2)	44.09	18.29
不明 (%)				1 (1.9)	13 (9.8)	52 (12.5)	142 (13.0)	260 (10.4)	570 (9.9)	846 (8.4)	994 (7.5)	1,246 (7.4)	1,925 (8.0)	3,145 (8.2)	2,738 (9.0)	2,970 (10.5)	2,633 (12.3)	1,497 (14.7)	425 (16.7)	52 (20.2)	19,509 (9.5)		1 (100.0)	19,510 (9.5)	69.18	13.10
再導入 (%)			1 (5.8)	2 (3.7)	2 (1.5)	12 (2.9)	37 (3.4)	48 (1.9)	104 (1.8)	161 (1.6)	218 (1.7)	236 (1.4)	222 (0.9)	205 (0.5)	83 (0.3)	60 (0.2)	20 (0.1)	15 (0.1)	2 (0.1)		1,428 (0.7)			1,428 (0.7)	56.94	11.88
その他 (%)	3 (21.4)	4 (25.0)	3 (17.6)	11 (20.4)	29 (21.8)	72 (17.3)	100 (9.2)	144 (5.8)	205 (3.6)	268 (2.7)	355 (2.7)	467 (2.2)	613 (1.9)	813 (2.1)	739 (2.4)	685 (2.4)	564 (2.6)	302 (3.0)	74 (2.9)	7 (2.7)	5,220 (2.5)			5,220 (2.5)	65.52	15.29
合計 (%)	14 (100.0)	16 (100.0)	17 (100.0)	54 (100.0)	133 (100.0)	415 (100.0)	1,089 (100.0)	2,502 (100.0)	5,756 (100.0)	10,065 (100.0)	13,201 (100.0)	16,809 (100.0)	24,075 (100.0)	38,453 (100.0)	30,534 (100.0)	28,409 (100.0)	21,396 (100.0)	10,179 (100.0)	2,547 (100.0)	258 (100.0)	205,922 (100.0)			205,923 (100.0)	67.34	12.38
記載なし																								1 (100.0)		
総計	14	16	17	54	133	415	1,089	2,502	5,756	10,065	13,201	16,809	24,075	38,453	30,534	28,409	21,396	10,179	2,547	258	205,922		1	205,923	67.34	12.38

数値下のかつこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0152##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査