

表 222 2016年末患者、原疾患別人数、平均年齢

原疾患	人数	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	91,783 (28.8)		91,783 (28.8)	67.28	12.39
慢性腎盂腎炎 (%)	2,896 (0.9)		2,896 (0.9)	66.14	13.81
急速進行性糸球体腎炎 (%)	2,538 (0.8)		2,538 (0.8)	69.54	12.72
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	1,483 (0.5)		1,483 (0.5)	65.76	10.27
その他の分類不能の腎炎 (%)	1,454 (0.5)		1,454 (0.5)	61.31	16.89
多発性囊胞腎 (%)	11,471 (3.6)		11,471 (3.6)	65.42	11.38
腎硬化症 (%)	31,650 (9.9)		31,650 (9.9)	74.32	11.76
悪性高血圧 (%)	2,721 (0.9)		2,721 (0.9)	64.21	14.87
糖尿病性腎症 (%)	123,657 (38.8)		123,657 (38.8)	67.70	11.38
SLE腎炎 (%)	2,222 (0.7)		2,222 (0.7)	61.75	13.68
アミロイド腎 (%)	438 (0.1)		438 (0.1)	67.80	11.22
痛風腎 (%)	1,056 (0.3)		1,056 (0.3)	68.02	11.23
先天性代謝異常による腎不全 (%)	281 (0.1)		281 (0.1)	50.82	17.30
腎・尿路結核 (%)	168 (0.1)		168 (0.1)	73.52	8.86
腎・尿路結石 (%)	578 (0.2)		578 (0.2)	71.22	10.82
腎・尿路腫瘍 (%)	959 (0.3)		959 (0.3)	72.30	10.79
閉塞性尿路障害 (%)	743 (0.2)		743 (0.2)	64.98	15.72
骨髄腫 (%)	323 (0.1)		323 (0.1)	70.95	10.81
腎形成不全 (%)	664 (0.2)		664 (0.2)	45.89	19.10
不明 (%)	31,410 (9.8)	2 (100.0)	31,412 (9.8)	70.27	13.09
再導入 (%)	2,174 (0.7)		2,174 (0.7)	56.98	12.50
その他 (%)	8,438 (2.6)		8,438 (2.6)	66.16	15.68
合計 (%)	319,107 (100.0)	2 (100.0)	319,109 (100.0)	68.15	12.48
記載なし					
総計	319,107	2	319,109	68.15	12.48

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

人数列右の「記載なし」:生年月日の記入がなく、年齢の算出ができなかった患者数

##A0157##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査