

表 229 2016年末患者、治療方法、透析歴別

治療方法	2年未満	2年～	5年～	10年～	15年～	20年～	25年～	30年～	35年～	40年～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析	55,651 (78.9)	59,579 (74.3)	58,194 (73.5)	29,142 (71.9)	15,217 (68.9)	8,019 (64.2)	4,029 (58.4)	2,168 (54.4)	1,078 (50.1)	385 (48.5)	233,462 (73.2)	242 (82.0)		233,704 (73.2)	6.83	7.11
血液透析濾過	11,231 (15.9)	17,473 (21.8)	19,189 (24.2)	10,947 (27.0)	6,578 (29.8)	4,156 (33.3)	2,549 (37.0)	1,486 (37.3)	842 (39.1)	313 (39.5)	74,764 (23.5)	35 (11.9)		74,799 (23.4)	9.07	8.47
血液濾過	3 (0.0)	1 (0.0)	8 (0.0)	3 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)		1 (0.0)			19 (0.0)			19 (0.0)	9.95	7.62
血液吸着透析	3 (0.0)	3 (0.0)	9 (0.0)	61 (0.2)	135 (0.6)	230 (1.8)	284 (4.1)	317 (8.0)	222 (10.3)	91 (11.5)	1,355 (0.4)			1,355 (0.4)	28.07	8.11
在宅血液透析	32 (0.0)	128 (0.2)	170 (0.2)	114 (0.3)	77 (0.3)	50 (0.4)	26 (0.4)	9 (0.2)	9 (0.4)	2 (0.3)	617 (0.2)			617 (0.2)	10.83	8.25
腹膜透析	3,618 (5.1)	2,984 (3.7)	1,575 (2.0)	289 (0.7)	85 (0.4)	28 (0.2)	9 (0.1)	6 (0.2)	1 (0.0)	2 (0.3)	8,597 (2.7)	18 (6.1)		8,615 (2.7)	3.03	3.52
合計	70,538 (100.0)	80,168 (100.0)	79,145 (100.0)	40,556 (100.0)	22,094 (100.0)	12,484 (100.0)	6,897 (100.0)	3,987 (100.0)	2,152 (100.0)	793 (100.0)	318,814 (100.0)	295 (100.0)		319,109 (100.0)	7.35	7.60
記載なし																
総計	70,538	80,168	79,145	40,556	22,094	12,484	6,897	3,987	2,152	793	318,814	295		319,109	7.35	7.60

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

##A016##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査