

表 241 2016年死亡患者(性別、原疾患)

原疾患	男性	女性	合計	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	4,245 (21.0)	2,538 (24.3)	6,783 (22.1)		6,783 (22.1)
慢性腎孟腎炎 (%)	118 (0.6)	105 (1.0)	223 (0.7)		223 (0.7)
急速進行性糸球体腎炎 (%)	170 (0.8)	155 (1.5)	325 (1.1)		325 (1.1)
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)		62 (0.6)	62 (0.2)		62 (0.2)
その他の分類不能の腎炎 (%)	72 (0.4)	34 (0.3)	106 (0.3)		106 (0.3)
多発性囊胞腎 (%)	387 (1.9)	258 (2.5)	645 (2.1)		645 (2.1)
腎硬化症 (%)	2,350 (11.6)	1,211 (11.6)	3,561 (11.6)		3,561 (11.6)
悪性高血圧 (%)	113 (0.6)	54 (0.5)	167 (0.5)		167 (0.5)
糖尿病性腎症 (%)	8,768 (43.4)	3,673 (35.2)	12,441 (40.6)		12,441 (40.6)
SLE腎炎 (%)	71 (0.4)	129 (1.2)	200 (0.7)		200 (0.7)
アミロイド腎 (%)	41 (0.2)	45 (0.4)	86 (0.3)		86 (0.3)
痛風腎 (%)	59 (0.3)	8 (0.1)	67 (0.2)		67 (0.2)
先天性代謝異常による腎不全 (%)	5 (0.0)	10 (0.1)	15 (0.0)		15 (0.0)
腎・尿路結核 (%)	15 (0.1)	8 (0.1)	23 (0.1)		23 (0.1)
腎・尿路結石 (%)	30 (0.1)	27 (0.3)	57 (0.2)		57 (0.2)
腎・尿路腫瘍 (%)	103 (0.5)	33 (0.3)	136 (0.4)		136 (0.4)
閉塞性尿路障害 (%)	48 (0.2)	30 (0.3)	78 (0.3)		78 (0.3)
骨髄腫 (%)	63 (0.3)	53 (0.5)	116 (0.4)		116 (0.4)
腎形成不全 (%)	10 (0.0)	6 (0.1)	16 (0.1)		16 (0.1)
不明 (%)	2,701 (13.4)	1,552 (14.9)	4,253 (13.9)		4,253 (13.9)
再導入 (%)	91 (0.5)	31 (0.3)	122 (0.4)		122 (0.4)
その他 (%)	739 (3.7)	419 (4.0)	1,158 (3.8)		1,158 (3.8)
合計 (%)	20,199 (100.0)	10,441 (100.0)	30,640 (100.0)		30,640 (100.0)
記載なし					
総計	20,199	10,441	30,640		30,640

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0176##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査