

表 246 2016年死亡患者(女性 年齢、原疾患)

原疾患	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)							1 (14.3)	3 (20.0)	8 (21.1)	11 (15.3)	27 (22.5)	54 (23.4)	104 (22.5)	234 (23.3)	328 (26.6)	440 (24.1)	540 (24.6)	468 (24.0)	256 (25.0)	64 (26.0)	2,538 (24.3)			2,538 (24.3)	78.81	9.88
慢性腎盂腎炎 (%)								1 (6.7)	2 (5.3)	1 (1.4)	2 (1.7)	3 (1.3)	3 (0.6)	12 (1.2)	11 (0.9)	21 (1.1)	14 (0.6)	27 (1.4)	7 (0.7)	1 (0.4)	105 (1.0)			105 (1.0)	77.10	12.06
急速進行性糸球体腎炎 (%)									1 (2.6)	2 (2.8)	4 (1.7)	6 (1.3)	8 (0.8)	15 (1.2)	21 (1.1)	44 (2.0)	31 (1.6)	15 (1.5)	8 (3.3)	155 (1.5)			155 (1.5)	80.08	10.01	
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)									1 (0.4)	1 (1.3)	1 (0.4)	6 (1.3)	14 (1.4)	18 (1.5)	7 (0.4)	9 (0.4)	6 (0.3)				62 (0.6)			62 (0.6)	72.52	8.52
その他の分類不能の腎炎 (%)								1 (6.7)		1 (1.4)	1 (0.4)	1 (0.6)	3 (0.2)	2 (0.3)	4 (0.3)	5 (0.2)	5 (0.3)	6 (0.5)	5 (0.4)	1 (0.3)	34 (0.3)			34 (0.3)	77.06	13.07
多発性囊胞腎 (%)									1 (1.4)	2 (1.7)	11 (4.8)	14 (3.0)	31 (3.1)	38 (3.1)	63 (3.4)	50 (2.3)	35 (1.8)	12 (1.2)	1 (0.4)	258 (2.5)			258 (2.5)	76.29	8.99	
腎硬化症 (%)							1 (14.3)	2 (13.3)	1 (2.6)	1 (1.4)	3 (2.5)	7 (3.0)	15 (3.2)	41 (4.1)	67 (5.4)	154 (8.4)	280 (12.7)	328 (16.8)	239 (23.3)	72 (29.3)	1,211 (11.6)			1,211 (11.6)	83.87	8.36
悪性高血圧 (%)										2 (2.8)	2 (1.7)	3 (1.3)	3 (0.6)	6 (0.6)	3 (0.2)	11 (0.5)	12 (0.5)	6 (0.3)	4 (0.4)	2 (0.8)	54 (0.5)			54 (0.5)	75.46	12.31
糖尿病性腎症 (%)					1 (33.3)		3 (42.9)	5 (33.3)	15 (39.5)	33 (45.8)	52 (43.3)	96 (41.6)	193 (41.8)	442 (43.9)	509 (41.3)	727 (39.7)	755 (34.4)	563 (28.9)	241 (23.5)	37 (15.0)	3,672 (35.2)	1 (100.0)		3,673 (35.2)	76.68	10.10
SLE腎炎 (%)									4 (10.5)	4 (5.6)	7 (5.8)	11 (4.8)	19 (4.1)	26 (2.6)	14 (1.1)	17 (0.9)	12 (0.5)	11 (0.6)	3 (0.3)	1 (0.4)	129 (1.2)			129 (1.2)	69.19	11.99
アミロイド腎 (%)										2 (2.8)		3 (1.3)	3 (0.6)	8 (0.8)	4 (0.3)	12 (0.7)	9 (0.4)	4 (0.2)			45 (0.4)			45 (0.4)	73.27	9.79
痛風腎 (%)												1 (0.2)	1 (0.1)		2 (0.1)	2 (0.1)	2 (0.1)	2 (0.1)			8 (0.1)			8 (0.1)	78.63	9.04
先天性代謝異常による腎不全 (%)						1 (50.0)			1 (2.6)		1 (0.8)	1 (0.4)		1 (0.1)	2 (0.2)	1 (0.1)	2 (0.1)	1 (0.1)			10 (0.1)			10 (0.1)	63.60	19.64
腎・尿路結核 (%)													1 (0.2)	1 (0.1)	2 (0.2)	1 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.1)			8 (0.1)			8 (0.1)	75.75	7.83
腎・尿路結石 (%)											1 (0.8)		1 (0.2)	1 (0.1)	2 (0.2)	3 (0.5)	10 (0.2)	3 (0.2)	4 (0.4)	2 (0.8)	27 (0.3)			27 (0.3)	81.30	9.67
腎・尿路腫瘍 (%)										1 (1.4)			2 (0.4)	4 (0.4)	4 (0.3)	8 (0.4)	5 (0.2)	5 (0.3)	4 (0.4)		33 (0.3)			33 (0.3)	77.18	9.96
閉塞性尿路障害 (%)							1 (14.3)						2 (0.4)	3 (0.3)	3 (0.5)	10 (0.4)	9 (0.2)	3 (0.2)	2 (0.2)	30 (0.3)			30 (0.3)	77.10	11.27	
骨髄腫 (%)									2 (5.3)				5 (1.1)	12 (1.2)	5 (0.4)	5 (0.3)	14 (0.6)	9 (0.5)	1 (0.1)		53 (0.5)			53 (0.5)	75.38	10.43
腎形成不全 (%)								1 (6.7)					1 (0.2)				1 (0.0)		2 (0.2)	1 (0.4)	6 (0.1)			6 (0.1)	76.00	23.00
不明 (%)				1 (100.0)		1 (50.0)			2 (5.3)	6 (8.3)	14 (11.7)	22 (9.5)	54 (11.7)	112 (11.1)	167 (13.5)	244 (13.3)	331 (15.1)	360 (18.5)	192 (18.7)	46 (18.7)	1,552 (14.9)			1,552 (14.9)	80.36	9.60
再導入 (%)								1 (6.7)			2 (1.7)	2 (0.9)	5 (1.1)	7 (0.7)	1 (0.1)	4 (0.2)	3 (0.1)	4 (0.2)		2 (0.8)	31 (0.3)			31 (0.3)	71.13	14.32
その他 (%)	1 (100.0)		1 (100.0)		2 (66.7)		1 (14.3)	1 (6.7)	2 (5.3)	6 (8.3)	7 (5.8)	12 (5.2)	21 (4.5)	40 (4.0)	39 (3.2)	74 (4.0)	89 (4.1)	76 (3.9)	39 (3.8)	8 (3.3)	419 (4.0)			419 (4.0)	77.12	12.69
合計 (%)	1 (100.0)		1 (100.0)	1 (100.0)	3 (100.0)	2 (100.0)	7 (100.0)	15 (100.0)	38 (100.0)	72 (100.0)	120 (100.0)	231 (100.0)	462 (100.0)	1,006 (100.0)	1,233 (100.0)	1,829 (100.0)	2,197 (100.0)	1,950 (100.0)	1,026 (100.0)	246 (100.0)	10,440 (100.0)	1 (100.0)		10,441 (100.0)	78.49	10.32
記載なし																										
総計	1		1	1	3	2	7	15	38	72	120	231	462	1,006	1,233	1,829	2,197	1,950	1,026	246	10,440	1		10,441	78.49	10.32

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。  
 ##A0181##  
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
 2016年調査