

表 251 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	5,076	2,811	7,887		7,887
(%)	(25.1)	(26.9)	(25.7)		(25.7)
脳血管障害	1,270	709	1,979		1,979
(%)	(6.3)	(6.8)	(6.5)		(6.5)
感染症	4,552	2,173	6,725		6,725
(%)	(22.5)	(20.8)	(21.9)		(21.9)
消化管出血	240	155	395		395
(%)	(1.2)	(1.5)	(1.3)		(1.3)
悪性腫瘍	2,141	826	2,967		2,967
(%)	(10.6)	(7.9)	(9.7)		(9.7)
悪液質/尿毒症	719	560	1,279		1,279
(%)	(3.6)	(5.4)	(4.2)		(4.2)
心筋梗塞	853	357	1,210		1,210
(%)	(4.2)	(3.4)	(3.9)		(3.9)
カリウム中毒/頓死	520	222	742		742
(%)	(2.6)	(2.1)	(2.4)		(2.4)
肝硬変症	179	71	250		250
(%)	(0.9)	(0.7)	(0.8)		(0.8)
自殺/拒否	142	57	199		199
(%)	(0.7)	(0.5)	(0.6)		(0.6)
腸閉塞	206	124	330		330
(%)	(1.0)	(1.2)	(1.1)		(1.1)
肺血栓/肺塞栓	35	25	60		60
(%)	(0.2)	(0.2)	(0.2)		(0.2)
災害・事故死	117	45	162		162
(%)	(0.6)	(0.4)	(0.5)		(0.5)
その他	1,881	1,197	3,078		3,078
(%)	(9.3)	(11.5)	(10.0)		(10.0)
不明	2,267	1,108	3,375		3,375
(%)	(11.2)	(10.6)	(11.0)		(11.0)
合計	20,198	10,440	30,638		30,638
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし	1	1	2		2
総計	20,199	10,441	30,640		30,640

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

#A0186##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査