

表 253 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (青森県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全 (%)	66 (26.0)	35 (25.9)	101 (26.0)		101 (26.0)
脳血管障害 (%)	20 (7.9)	10 (7.4)	30 (7.7)		30 (7.7)
感染症 (%)	54 (21.3)	21 (15.6)	75 (19.3)		75 (19.3)
消化管出血 (%)	4 (1.6)	4 (3.0)	8 (2.1)		8 (2.1)
悪性腫瘍 (%)	23 (9.1)	10 (7.4)	33 (8.5)		33 (8.5)
悪液質/尿毒症 (%)	8 (3.1)	8 (5.9)	16 (4.1)		16 (4.1)
心筋梗塞 (%)	6 (2.4)	1 (0.7)	7 (1.8)		7 (1.8)
カリウム中毒/頓死 (%)	8 (3.1)	6 (4.4)	14 (3.6)		14 (3.6)
肝硬変症 (%)	3 (1.2)	1 (0.7)	4 (1.0)		4 (1.0)
自殺/拒否 (%)	3 (1.2)		3 (0.8)		3 (0.8)
腸閉塞 (%)	1 (0.4)	1 (0.7)	2 (0.5)		2 (0.5)
肺血栓/肺塞栓 (%)	1 (0.4)		1 (0.3)		1 (0.3)
災害・事故死 (%)	1 (0.4)		1 (0.3)		1 (0.3)
その他 (%)	16 (6.3)	17 (12.6)	33 (8.5)		33 (8.5)
不明 (%)	40 (15.7)	21 (15.6)	61 (15.7)		61 (15.7)
合計 (%)	254 (100.0)	135 (100.0)	389 (100.0)		389 (100.0)
記載なし					
総計	254	135	389		389

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

#A0188##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査