

表 255 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (宮城県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全 (%)	69 (24.1)	33 (21.4)	102 (23.2)		102 (23.2)
脳血管障害 (%)	19 (6.6)	6 (3.9)	25 (5.7)		25 (5.7)
感染症 (%)	68 (23.8)	45 (29.2)	113 (25.7)		113 (25.7)
消化管出血 (%)	2 (0.7)	2 (1.3)	4 (0.9)		4 (0.9)
悪性腫瘍 (%)	32 (11.2)	13 (8.4)	45 (10.2)		45 (10.2)
悪液質/尿毒症 (%)	11 (3.8)	12 (7.8)	23 (5.2)		23 (5.2)
心筋梗塞 (%)	13 (4.5)	6 (3.9)	19 (4.3)		19 (4.3)
カリウム中毒/頓死 (%)	13 (4.5)	3 (1.9)	16 (3.6)		16 (3.6)
肝硬変症 (%)	2 (0.7)	1 (0.6)	3 (0.7)		3 (0.7)
自殺/拒否 (%)					
腸閉塞 (%)	2 (0.7)	3 (1.9)	5 (1.1)		5 (1.1)
肺血栓/肺塞栓 (%)		1 (0.6)	1 (0.2)		1 (0.2)
災害・事故死 (%)	2 (0.7)		2 (0.5)		2 (0.5)
その他 (%)	26 (9.1)	12 (7.8)	38 (8.6)		38 (8.6)
不明 (%)	27 (9.4)	17 (11.0)	44 (10.0)		44 (10.0)
合計 (%)	286 (100.0)	154 (100.0)	440 (100.0)		440 (100.0)
記載なし					
総計	286	154	440		440

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

##A0190##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査