

表 256 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(秋田県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	42	17	59		59
(%)	(25.8)	(20.0)	(23.8)		(23.8)
脳血管障害	16	15	31		31
(%)	(9.8)	(17.6)	(12.5)		(12.5)
感染症	22	8	30		30
(%)	(13.5)	(9.4)	(12.1)		(12.1)
消化管出血	1		1		1
(%)	(0.6)		(0.4)		(0.4)
悪性腫瘍	15	6	21		21
(%)	(9.2)	(7.1)	(8.5)		(8.5)
悪液質/尿毒症	11	7	18		18
(%)	(6.7)	(8.2)	(7.3)		(7.3)
心筋梗塞	10	1	11		11
(%)	(6.1)	(1.2)	(4.4)		(4.4)
カリウム中毒/頓死	7	3	10		10
(%)	(4.3)	(3.5)	(4.0)		(4.0)
肝硬変症	1	1	2		2
(%)	(0.6)	(1.2)	(0.8)		(0.8)
自殺/拒否					
(%)					
腸閉塞	3	1	4		4
(%)	(1.8)	(1.2)	(1.6)		(1.6)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死		1	1		1
(%)		(1.2)	(0.4)		(0.4)
その他	8	14	22		22
(%)	(4.9)	(16.5)	(8.9)		(8.9)
不明	27	11	38		38
(%)	(16.6)	(12.9)	(15.3)		(15.3)
合計	163	85	248		248
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	163	85	248		248

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0191##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査