

表 257 2016年死亡患者死亡原因分類 (性別との関係) (山形県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	33	24	57		57
(%)	(21.6)	(25.8)	(23.2)		(23.2)
脳血管障害	14	2	16		16
(%)	(9.2)	(2.2)	(6.5)		(6.5)
感染症	27	11	38		38
(%)	(17.6)	(11.8)	(15.4)		(15.4)
消化管出血	4		4		4
(%)	(2.6)		(1.6)		(1.6)
悪性腫瘍	22	10	32		32
(%)	(14.4)	(10.8)	(13.0)		(13.0)
悪液質/尿毒症	9	6	15		15
(%)	(5.9)	(6.5)	(6.1)		(6.1)
心筋梗塞	9	2	11		11
(%)	(5.9)	(2.2)	(4.5)		(4.5)
カリウム中毒/頓死	2	2	4		4
(%)	(1.3)	(2.2)	(1.6)		(1.6)
肝硬変症		2	2		2
(%)		(2.2)	(0.8)		(0.8)
自殺/拒否		1	1		1
(%)		(1.1)	(0.4)		(0.4)
腸閉塞					
(%)					
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	2	1	3		3
(%)	(1.3)	(1.1)	(1.2)		(1.2)
その他	15	17	32		32
(%)	(9.8)	(18.3)	(13.0)		(13.0)
不明	16	15	31		31
(%)	(10.5)	(16.1)	(12.6)		(12.6)
合計	153	93	246		246
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	153	93	246		246

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0192##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査