

表 259 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (茨城県)

| 死因 | 男性 | 女性 | 合計 | 記載なし | 総計 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 心不全 (%) | 158 (35.7) | 96 (36.5) | 254 (36.0) | | 254 (36.0) |
| 脳血管障害 (%) | 24 (5.4) | 21 (8.0) | 45 (6.4) | | 45 (6.4) |
| 感染症 (%) | 92 (20.8) | 46 (17.5) | 138 (19.6) | | 138 (19.6) |
| 消化管出血 (%) | 2 (0.5) | 6 (2.3) | 8 (1.1) | | 8 (1.1) |
| 悪性腫瘍 (%) | 37 (8.4) | 12 (4.6) | 49 (7.0) | | 49 (7.0) |
| 悪液質/尿毒症 (%) | 6 (1.4) | 8 (3.0) | 14 (2.0) | | 14 (2.0) |
| 心筋梗塞 (%) | 21 (4.8) | 8 (3.0) | 29 (4.1) | | 29 (4.1) |
| カリウム中毒/頓死 (%) | 11 (2.5) | 6 (2.3) | 17 (2.4) | | 17 (2.4) |
| 肝硬変症 (%) | 1 (0.2) | 4 (1.5) | 5 (0.7) | | 5 (0.7) |
| 自殺/拒否 (%) | 5 (1.1) | 2 (0.8) | 7 (1.0) | | 7 (1.0) |
| 腸閉塞 (%) | 2 (0.5) | 1 (0.4) | 3 (0.4) | | 3 (0.4) |
| 肺血栓/肺塞栓 (%) | 1 (0.2) | | 1 (0.1) | | 1 (0.1) |
| 災害・事故死 (%) | 5 (1.1) | 1 (0.4) | 6 (0.9) | | 6 (0.9) |
| その他 (%) | 44 (10.0) | 35 (13.3) | 79 (11.2) | | 79 (11.2) |
| 不明 (%) | 33 (7.5) | 17 (6.5) | 50 (7.1) | | 50 (7.1) |
| 合計 (%) | 442 (100.0) | 263 (100.0) | 705 (100.0) | | 705 (100.0) |
| 記載なし | | | | | |
| 総計 | 442 | 263 | 705 | | 705 |

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

#A0194##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査