

表 260 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (栃木県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全 (%)	112 (30.8)	40 (24.8)	152 (29.0)		152 (29.0)
脳血管障害 (%)	26 (7.1)	17 (10.6)	43 (8.2)		43 (8.2)
感染症 (%)	71 (19.5)	27 (16.8)	98 (18.7)		98 (18.7)
消化管出血 (%)	3 (0.8)	1 (0.6)	4 (0.8)		4 (0.8)
悪性腫瘍 (%)	36 (9.9)	12 (7.5)	48 (9.1)		48 (9.1)
悪液質/尿毒症 (%)	15 (4.1)	12 (7.5)	27 (5.1)		27 (5.1)
心筋梗塞 (%)	25 (6.9)	9 (5.6)	34 (6.5)		34 (6.5)
カリウム中毒/頓死 (%)	6 (1.6)	3 (1.9)	9 (1.7)		9 (1.7)
肝硬変症 (%)	1 (0.3)		1 (0.2)		1 (0.2)
自殺/拒否 (%)	2 (0.5)		2 (0.4)		2 (0.4)
腸閉塞 (%)	3 (0.8)		3 (0.6)		3 (0.6)
肺血栓/肺塞栓 (%)	1 (0.3)		1 (0.2)		1 (0.2)
災害・事故死 (%)	2 (0.5)	1 (0.6)	3 (0.6)		3 (0.6)
その他 (%)	25 (6.9)	27 (16.8)	52 (9.9)		52 (9.9)
不明 (%)	36 (9.9)	12 (7.5)	48 (9.1)		48 (9.1)
合計 (%)	364 (100.0)	161 (100.0)	525 (100.0)		525 (100.0)
記載なし					
総計	364	161	525		525

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

#A0195##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査