

表 262 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (埼玉県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	297	120	417		417
(%)	(26.3)	(23.6)	(25.5)		(25.5)
脳血管障害	78	35	113		113
(%)	(6.9)	(6.9)	(6.9)		(6.9)
感染症	229	94	323		323
(%)	(20.3)	(18.5)	(19.7)		(19.7)
消化管出血	22	14	36		36
(%)	(1.9)	(2.8)	(2.2)		(2.2)
悪性腫瘍	102	45	147		147
(%)	(9.0)	(8.9)	(9.0)		(9.0)
悪液質/尿毒症	23	21	44		44
(%)	(2.0)	(4.1)	(2.7)		(2.7)
心筋梗塞	61	22	83		83
(%)	(5.4)	(4.3)	(5.1)		(5.1)
カリウム中毒/頓死	29	19	48		48
(%)	(2.6)	(3.7)	(2.9)		(2.9)
肝硬変症	8	3	11		11
(%)	(0.7)	(0.6)	(0.7)		(0.7)
自殺/拒否	8	1	9		9
(%)	(0.7)	(0.2)	(0.5)		(0.5)
腸閉塞	7	4	11		11
(%)	(0.6)	(0.8)	(0.7)		(0.7)
肺血栓/肺塞栓	3	3	6		6
(%)	(0.3)	(0.6)	(0.4)		(0.4)
災害・事故死	4	2	6		6
(%)	(0.4)	(0.4)	(0.4)		(0.4)
その他	87	49	136		136
(%)	(7.7)	(9.6)	(8.3)		(8.3)
不明	171	76	247		247
(%)	(15.1)	(15.0)	(15.1)		(15.1)
合計	1,129	508	1,637		1,637
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	1,129	508	1,637		1,637

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

#A0197##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査