

表 264 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (東京都)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	431	201	632		632
(%)	(22.9)	(22.3)	(22.7)		(22.7)
脳血管障害	112	65	177		177
(%)	(5.9)	(7.2)	(6.4)		(6.4)
感染症	411	181	592		592
(%)	(21.8)	(20.1)	(21.2)		(21.2)
消化管出血	20	15	35		35
(%)	(1.1)	(1.7)	(1.3)		(1.3)
悪性腫瘍	191	100	291		291
(%)	(10.1)	(11.1)	(10.4)		(10.4)
悪液質/尿毒症	68	42	110		110
(%)	(3.6)	(4.7)	(3.9)		(3.9)
心筋梗塞	79	27	106		106
(%)	(4.2)	(3.0)	(3.8)		(3.8)
カリウム中毒/頓死	64	26	90		90
(%)	(3.4)	(2.9)	(3.2)		(3.2)
肝硬変症	19	5	24		24
(%)	(1.0)	(0.6)	(0.9)		(0.9)
自殺/拒否	12	5	17		17
(%)	(0.6)	(0.6)	(0.6)		(0.6)
腸閉塞	18	12	30		30
(%)	(1.0)	(1.3)	(1.1)		(1.1)
肺血栓/肺塞栓		4	4		4
(%)		(0.4)	(0.1)		(0.1)
災害・事故死	10	5	15		15
(%)	(0.5)	(0.6)	(0.5)		(0.5)
その他	168	108	276		276
(%)	(8.9)	(12.0)	(9.9)		(9.9)
不明	281	106	387		387
(%)	(14.9)	(11.8)	(13.9)		(13.9)
合計	1,884	902	2,786		2,786
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし	1	1	2		2
総計	1,885	903	2,788		2,788

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0199##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査