

表 266 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (新潟県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全 (%)	72 (26.8)	45 (29.0)	117 (27.6)		117 (27.6)
脳血管障害 (%)	16 (5.9)	8 (5.2)	24 (5.7)		24 (5.7)
感染症 (%)	56 (20.8)	27 (17.4)	83 (19.6)		83 (19.6)
消化管出血 (%)	1 (0.4)	4 (2.6)	5 (1.2)		5 (1.2)
悪性腫瘍 (%)	26 (9.7)	14 (9.0)	40 (9.4)		40 (9.4)
悪液質/尿毒症 (%)	10 (3.7)	12 (7.7)	22 (5.2)		22 (5.2)
心筋梗塞 (%)	13 (4.8)	4 (2.6)	17 (4.0)		17 (4.0)
カリウム中毒/頓死 (%)	2 (0.7)	4 (2.6)	6 (1.4)		6 (1.4)
肝硬変症 (%)	2 (0.7)		2 (0.5)		2 (0.5)
自殺/拒否 (%)	3 (1.1)	1 (0.6)	4 (0.9)		4 (0.9)
腸閉塞 (%)	3 (1.1)	1 (0.6)	4 (0.9)		4 (0.9)
肺血栓/肺塞栓 (%)		1 (0.6)	1 (0.2)		1 (0.2)
災害・事故死 (%)	1 (0.4)	1 (0.6)	2 (0.5)		2 (0.5)
その他 (%)	25 (9.3)	12 (7.7)	37 (8.7)		37 (8.7)
不明 (%)	39 (14.5)	21 (13.5)	60 (14.2)		60 (14.2)
合計 (%)	269 (100.0)	155 (100.0)	424 (100.0)		424 (100.0)
記載なし					
総計	269	155	424		424

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

##A0201##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査