

表 267 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (富山県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全 (%)	33 (21.4)	24 (33.3)	57 (25.2)		57 (25.2)
脳血管障害 (%)	21 (13.6)	7 (9.7)	28 (12.4)		28 (12.4)
感染症 (%)	39 (25.3)	12 (16.7)	51 (22.6)		51 (22.6)
消化管出血 (%)	2 (1.3)	1 (1.4)	3 (1.3)		3 (1.3)
悪性腫瘍 (%)	19 (12.3)	7 (9.7)	26 (11.5)		26 (11.5)
悪液質/尿毒症 (%)	5 (3.2)	6 (8.3)	11 (4.9)		11 (4.9)
心筋梗塞 (%)	5 (3.2)	2 (2.8)	7 (3.1)		7 (3.1)
カリウム中毒/頓死 (%)	4 (2.6)		4 (1.8)		4 (1.8)
肝硬変症 (%)	1 (0.6)	2 (2.8)	3 (1.3)		3 (1.3)
自殺/拒否 (%)					
腸閉塞 (%)	2 (1.3)		2 (0.9)		2 (0.9)
肺血栓/肺塞栓 (%)	2 (1.3)		2 (0.9)		2 (0.9)
災害・事故死 (%)	2 (1.3)		2 (0.9)		2 (0.9)
その他 (%)	6 (3.9)	6 (8.3)	12 (5.3)		12 (5.3)
不明 (%)	13 (8.4)	5 (6.9)	18 (8.0)		18 (8.0)
合計 (%)	154 (100.0)	72 (100.0)	226 (100.0)		226 (100.0)
記載なし					
総計	154	72	226		226

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

##A0202##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査