

表 268 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(石川県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	30	21	51		51
(%)	(17.9)	(21.4)	(19.2)		(19.2)
脳血管障害	17	4	21		21
(%)	(10.1)	(4.1)	(7.9)		(7.9)
感染症	35	23	58		58
(%)	(20.8)	(23.5)	(21.8)		(21.8)
消化管出血	2		2		2
(%)	(1.2)		(0.8)		(0.8)
悪性腫瘍	20	9	29		29
(%)	(11.9)	(9.2)	(10.9)		(10.9)
悪液質/尿毒症	5	3	8		8
(%)	(3.0)	(3.1)	(3.0)		(3.0)
心筋梗塞	10	2	12		12
(%)	(6.0)	(2.0)	(4.5)		(4.5)
カリウム中毒/頓死	5	2	7		7
(%)	(3.0)	(2.0)	(2.6)		(2.6)
肝硬変症		1	1		1
(%)		(1.0)	(0.4)		(0.4)
自殺/拒否	1	3	4		4
(%)	(0.6)	(3.1)	(1.5)		(1.5)
腸閉塞					
(%)					
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死					
(%)					
その他	27	22	49		49
(%)	(16.1)	(22.4)	(18.4)		(18.4)
不明	16	8	24		24
(%)	(9.5)	(8.2)	(9.0)		(9.0)
合計	168	98	266		266
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	168	98	266		266

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0203##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査