

表 269 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(福井県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	30	10	40		40
(%)	(21.9)	(17.5)	(20.6)		(20.6)
脳血管障害	11	5	16		16
(%)	(8.0)	(8.8)	(8.2)		(8.2)
感染症	21	12	33		33
(%)	(15.3)	(21.1)	(17.0)		(17.0)
消化管出血	1	1	2		2
(%)	(0.7)	(1.8)	(1.0)		(1.0)
悪性腫瘍	13	4	17		17
(%)	(9.5)	(7.0)	(8.8)		(8.8)
悪液質/尿毒症	6	5	11		11
(%)	(4.4)	(8.8)	(5.7)		(5.7)
心筋梗塞	9	5	14		14
(%)	(6.6)	(8.8)	(7.2)		(7.2)
カリウム中毒/頓死	9	1	10		10
(%)	(6.6)	(1.8)	(5.2)		(5.2)
肝硬変症	4		4		4
(%)	(2.9)		(2.1)		(2.1)
自殺/拒否	1		1		1
(%)	(0.7)		(0.5)		(0.5)
腸閉塞	4	1	5		5
(%)	(2.9)	(1.8)	(2.6)		(2.6)
肺血栓/肺塞栓	1		1		1
(%)	(0.7)		(0.5)		(0.5)
災害・事故死	1		1		1
(%)	(0.7)		(0.5)		(0.5)
その他	11	5	16		16
(%)	(8.0)	(8.8)	(8.2)		(8.2)
不明	15	8	23		23
(%)	(10.9)	(14.0)	(11.9)		(11.9)
合計	137	57	194		194
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	137	57	194		194

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0204##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査