

表 270 2016年死亡患者死亡原因分類 (性別との関係) (山梨県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	49	21	70		70
(%)	(27.7)	(25.6)	(27.0)		(27.0)
脳血管障害	11	4	15		15
(%)	(6.2)	(4.9)	(5.8)		(5.8)
感染症	40	21	61		61
(%)	(22.6)	(25.6)	(23.6)		(23.6)
消化管出血	1		1		1
(%)	(0.6)		(0.4)		(0.4)
悪性腫瘍	23	6	29		29
(%)	(13.0)	(7.3)	(11.2)		(11.2)
悪液質/尿毒症	3	4	7		7
(%)	(1.7)	(4.9)	(2.7)		(2.7)
心筋梗塞	9	4	13		13
(%)	(5.1)	(4.9)	(5.0)		(5.0)
カリウム中毒/頓死	4	3	7		7
(%)	(2.3)	(3.7)	(2.7)		(2.7)
肝硬変症	1		1		1
(%)	(0.6)		(0.4)		(0.4)
自殺/拒否	1	1	2		2
(%)	(0.6)	(1.2)	(0.8)		(0.8)
腸閉塞	1	2	3		3
(%)	(0.6)	(2.4)	(1.2)		(1.2)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	1		1		1
(%)	(0.6)		(0.4)		(0.4)
その他	15	11	26		26
(%)	(8.5)	(13.4)	(10.0)		(10.0)
不明	18	5	23		23
(%)	(10.2)	(6.1)	(8.9)		(8.9)
合計	177	82	259		259
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	177	82	259		259

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0205##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査