

表 271 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (長野県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全 (%)	103 (29.8)	65 (34.6)	168 (31.5)		168 (31.5)
脳血管障害 (%)	29 (8.4)	15 (8.0)	44 (8.2)		44 (8.2)
感染症 (%)	58 (16.8)	28 (14.9)	86 (16.1)		86 (16.1)
消化管出血 (%)	2 (0.6)	1 (0.5)	3 (0.6)		3 (0.6)
悪性腫瘍 (%)	40 (11.6)	11 (5.9)	51 (9.6)		51 (9.6)
悪液質/尿毒症 (%)	13 (3.8)	5 (2.7)	18 (3.4)		18 (3.4)
心筋梗塞 (%)	8 (2.3)	4 (2.1)	12 (2.2)		12 (2.2)
カリウム中毒/頓死 (%)	6 (1.7)	2 (1.1)	8 (1.5)		8 (1.5)
肝硬変症 (%)	4 (1.2)		4 (0.7)		4 (0.7)
自殺/拒否 (%)		3 (1.6)	3 (0.6)		3 (0.6)
腸閉塞 (%)	1 (0.3)	3 (1.6)	4 (0.7)		4 (0.7)
肺血栓/肺塞栓 (%)		1 (0.5)	1 (0.2)		1 (0.2)
災害・事故死 (%)	1 (0.3)	1 (0.5)	2 (0.4)		2 (0.4)
その他 (%)	38 (11.0)	29 (15.4)	67 (12.5)		67 (12.5)
不明 (%)	43 (12.4)	20 (10.6)	63 (11.8)		63 (11.8)
合計 (%)	346 (100.0)	188 (100.0)	534 (100.0)		534 (100.0)
記載なし					
総計	346	188	534		534

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

##A0206##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査