

表 272 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(岐阜県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	81	50	131		131
(%)	(25.2)	(28.9)	(26.5)		(26.5)
脳血管障害	24	21	45		45
(%)	(7.5)	(12.1)	(9.1)		(9.1)
感染症	77	17	94		94
(%)	(24.0)	(9.8)	(19.0)		(19.0)
消化管出血	7	1	8		8
(%)	(2.2)	(0.6)	(1.6)		(1.6)
悪性腫瘍	38	14	52		52
(%)	(11.8)	(8.1)	(10.5)		(10.5)
悪液質/尿毒症	17	12	29		29
(%)	(5.3)	(6.9)	(5.9)		(5.9)
心筋梗塞	5	7	12		12
(%)	(1.6)	(4.0)	(2.4)		(2.4)
カリウム中毒/頓死	9	2	11		11
(%)	(2.8)	(1.2)	(2.2)		(2.2)
肝硬変症		3	3		3
(%)		(1.7)	(0.6)		(0.6)
自殺/拒否	3	1	4		4
(%)	(0.9)	(0.6)	(0.8)		(0.8)
腸閉塞	6	4	10		10
(%)	(1.9)	(2.3)	(2.0)		(2.0)
肺血栓/肺塞栓	1	2	3		3
(%)	(0.3)	(1.2)	(0.6)		(0.6)
災害・事故死	1		1		1
(%)	(0.3)		(0.2)		(0.2)
その他	30	23	53		53
(%)	(9.3)	(13.3)	(10.7)		(10.7)
不明	22	16	38		38
(%)	(6.9)	(9.2)	(7.7)		(7.7)
合計	321	173	494		494
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	321	173	494		494

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0207##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査