

表 273 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (静岡県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全 (%)	123 (19.8)	75 (24.9)	198 (21.5)		198 (21.5)
脳血管障害 (%)	40 (6.5)	16 (5.3)	56 (6.1)		56 (6.1)
感染症 (%)	123 (19.8)	63 (20.9)	186 (20.2)		186 (20.2)
消化管出血 (%)	6 (1.0)	5 (1.7)	11 (1.2)		11 (1.2)
悪性腫瘍 (%)	65 (10.5)	15 (5.0)	80 (8.7)		80 (8.7)
悪液質/尿毒症 (%)	49 (7.9)	30 (10.0)	79 (8.6)		79 (8.6)
心筋梗塞 (%)	24 (3.9)	13 (4.3)	37 (4.0)		37 (4.0)
カリウム中毒/頓死 (%)	8 (1.3)	4 (1.3)	12 (1.3)		12 (1.3)
肝硬変症 (%)	6 (1.0)	1 (0.3)	7 (0.8)		7 (0.8)
自殺/拒否 (%)	6 (1.0)	6 (2.0)	12 (1.3)		12 (1.3)
腸閉塞 (%)	5 (0.8)	3 (1.0)	8 (0.9)		8 (0.9)
肺血栓/肺塞栓 (%)	3 (0.5)		3 (0.3)		3 (0.3)
災害・事故死 (%)		1 (0.3)	1 (0.1)		1 (0.1)
その他 (%)	84 (13.5)	34 (11.3)	118 (12.8)		118 (12.8)
不明 (%)	78 (12.6)	35 (11.6)	113 (12.3)		113 (12.3)
合計 (%)	620 (100.0)	301 (100.0)	921 (100.0)		921 (100.0)
記載なし					
総計	620	301	921		921

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

#A0208##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査