

表 274 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (愛知県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	224	136	360		360
(%)	(22.7)	(27.1)	(24.2)		(24.2)
脳血管障害	51	23	74		74
(%)	(5.2)	(4.6)	(5.0)		(5.0)
感染症	234	94	328		328
(%)	(23.7)	(18.7)	(22.0)		(22.0)
消化管出血	15	11	26		26
(%)	(1.5)	(2.2)	(1.7)		(1.7)
悪性腫瘍	116	38	154		154
(%)	(11.7)	(7.6)	(10.3)		(10.3)
悪液質/尿毒症	20	18	38		38
(%)	(2.0)	(3.6)	(2.6)		(2.6)
心筋梗塞	36	21	57		57
(%)	(3.6)	(4.2)	(3.8)		(3.8)
カリウム中毒/頓死	30	12	42		42
(%)	(3.0)	(2.4)	(2.8)		(2.8)
肝硬変症	4	2	6		6
(%)	(0.4)	(0.4)	(0.4)		(0.4)
自殺/拒否	5	1	6		6
(%)	(0.5)	(0.2)	(0.4)		(0.4)
腸閉塞	12	8	20		20
(%)	(1.2)	(1.6)	(1.3)		(1.3)
肺血栓/肺塞栓	1		1		1
(%)	(0.1)		(0.1)		(0.1)
災害・事故死	6	2	8		8
(%)	(0.6)	(0.4)	(0.5)		(0.5)
その他	86	65	151		151
(%)	(8.7)	(12.9)	(10.1)		(10.1)
不明	148	71	219		219
(%)	(15.0)	(14.1)	(14.7)		(14.7)
合計	988	502	1,490		1,490
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	988	502	1,490		1,490

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

##A0209##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査