

表 275 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (三重県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	61	47	108		108
(%)	(21.9)	(31.1)	(25.1)		(25.1)
脳血管障害	14	9	23		23
(%)	(5.0)	(6.0)	(5.3)		(5.3)
感染症	67	36	103		103
(%)	(24.0)	(23.8)	(24.0)		(24.0)
消化管出血	3	4	7		7
(%)	(1.1)	(2.6)	(1.6)		(1.6)
悪性腫瘍	33	8	41		41
(%)	(11.8)	(5.3)	(9.5)		(9.5)
悪液質/尿毒症	27	13	40		40
(%)	(9.7)	(8.6)	(9.3)		(9.3)
心筋梗塞	12	7	19		19
(%)	(4.3)	(4.6)	(4.4)		(4.4)
カリウム中毒/頓死	14	1	15		15
(%)	(5.0)	(0.7)	(3.5)		(3.5)
肝硬変症	3	1	4		4
(%)	(1.1)	(0.7)	(0.9)		(0.9)
自殺/拒否	2		2		2
(%)	(0.7)		(0.5)		(0.5)
腸閉塞	1	3	4		4
(%)	(0.4)	(2.0)	(0.9)		(0.9)
肺血栓/肺塞栓	1		1		1
(%)	(0.4)		(0.2)		(0.2)
災害・事故死	1		1		1
(%)	(0.4)		(0.2)		(0.2)
その他	24	14	38		38
(%)	(8.6)	(9.3)	(8.8)		(8.8)
不明	16	8	24		24
(%)	(5.7)	(5.3)	(5.6)		(5.6)
合計	279	151	430		430
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	279	151	430		430

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

##A0210##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査