

表 276 2016年死亡患者死亡原因分類 (性別との関係) (滋賀県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	53	33	86		86
(%)	(23.3)	(25.6)	(24.2)		(24.2)
脳血管障害	17	7	24		24
(%)	(7.5)	(5.4)	(6.7)		(6.7)
感染症	55	29	84		84
(%)	(24.2)	(22.5)	(23.6)		(23.6)
消化管出血	4	1	5		5
(%)	(1.8)	(0.8)	(1.4)		(1.4)
悪性腫瘍	29	16	45		45
(%)	(12.8)	(12.4)	(12.6)		(12.6)
悪液質/尿毒症	8	7	15		15
(%)	(3.5)	(5.4)	(4.2)		(4.2)
心筋梗塞	8	2	10		10
(%)	(3.5)	(1.6)	(2.8)		(2.8)
カリウム中毒/頓死	7		7		7
(%)	(3.1)		(2.0)		(2.0)
肝硬変症	3	2	5		5
(%)	(1.3)	(1.6)	(1.4)		(1.4)
自殺/拒否	2	1	3		3
(%)	(0.9)	(0.8)	(0.8)		(0.8)
腸閉塞	2	1	3		3
(%)	(0.9)	(0.8)	(0.8)		(0.8)
肺血栓/肺塞栓	1	1	2		2
(%)	(0.4)	(0.8)	(0.6)		(0.6)
災害・事故死		1	1		1
(%)		(0.8)	(0.3)		(0.3)
その他	15	19	34		34
(%)	(6.6)	(14.7)	(9.6)		(9.6)
不明	23	9	32		32
(%)	(10.1)	(7.0)	(9.0)		(9.0)
合計	227	129	356		356
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	227	129	356		356

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0211##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査