

表 278 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (大阪府)

| 死因 | 男性 | 女性 | 合計 | 記載なし | 総計 |
|------------------|------------------|----------------|------------------|------|------------------|
| 心不全 (%) | 331 (22.4) | 212 (25.3) | 543 (23.4) | | 543 (23.4) |
| 脳血管障害 (%) | 69 (4.7) | 35 (4.2) | 104 (4.5) | | 104 (4.5) |
| 感染症 (%) | 416 (28.1) | 226 (27.0) | 642 (27.7) | | 642 (27.7) |
| 消化管出血 (%) | 18 (1.2) | 7 (0.8) | 25 (1.1) | | 25 (1.1) |
| 悪性腫瘍 (%) | 161 (10.9) | 55 (6.6) | 216 (9.3) | | 216 (9.3) |
| 悪液質/尿毒症 (%) | 30 (2.0) | 22 (2.6) | 52 (2.2) | | 52 (2.2) |
| 心筋梗塞 (%) | 58 (3.9) | 32 (3.8) | 90 (3.9) | | 90 (3.9) |
| カリウム中毒/頓死 (%) | 35 (2.4) | 13 (1.6) | 48 (2.1) | | 48 (2.1) |
| 肝硬変症 (%) | 16 (1.1) | 13 (1.6) | 29 (1.3) | | 29 (1.3) |
| 自殺/拒否 (%) | 11 (0.7) | 6 (0.7) | 17 (0.7) | | 17 (0.7) |
| 腸閉塞 (%) | 17 (1.1) | 12 (1.4) | 29 (1.3) | | 29 (1.3) |
| 肺血栓/肺塞栓 (%) | 2 (0.1) | 1 (0.1) | 3 (0.1) | | 3 (0.1) |
| 災害・事故死 (%) | 5 (0.3) | 2 (0.2) | 7 (0.3) | | 7 (0.3) |
| その他 (%) | 174 (11.8) | 113 (13.5) | 287 (12.4) | | 287 (12.4) |
| 不明 (%) | 137 (9.3) | 89 (10.6) | 226 (9.7) | | 226 (9.7) |
| 合計 (%) | 1,480 (100.0) | 838 (100.0) | 2,318 (100.0) | | 2,318 (100.0) |
| 記載なし | | | | | |
| 総計 | 1,480 | 838 | 2,318 | | 2,318 |

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

##A0213##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査