

表 280 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(奈良県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	76	39	115		115
(%)	(29.6)	(40.2)	(32.5)		(32.5)
脳血管障害	14	5	19		19
(%)	(5.4)	(5.2)	(5.4)		(5.4)
感染症	60	12	72		72
(%)	(23.3)	(12.4)	(20.3)		(20.3)
消化管出血		1	1		1
(%)		(1.0)	(0.3)		(0.3)
悪性腫瘍	26	5	31		31
(%)	(10.1)	(5.2)	(8.8)		(8.8)
悪液質/尿毒症	6	3	9		9
(%)	(2.3)	(3.1)	(2.5)		(2.5)
心筋梗塞	10	5	15		15
(%)	(3.9)	(5.2)	(4.2)		(4.2)
カリウム中毒/頓死	10	4	14		14
(%)	(3.9)	(4.1)	(4.0)		(4.0)
肝硬変症					
(%)					
自殺/拒否	4		4		4
(%)	(1.6)		(1.1)		(1.1)
腸閉塞	5		5		5
(%)	(1.9)		(1.4)		(1.4)
肺血栓/肺塞栓	1		1		1
(%)	(0.4)		(0.3)		(0.3)
災害・事故死					
(%)					
その他	17	7	24		24
(%)	(6.6)	(7.2)	(6.8)		(6.8)
不明	28	16	44		44
(%)	(10.9)	(16.5)	(12.4)		(12.4)
合計	257	97	354		354
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	257	97	354		354

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0215##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査