

表 283 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(島根県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	19	12	31		31
(%)	(20.9)	(25.0)	(22.3)		(22.3)
脳血管障害	8	2	10		10
(%)	(8.8)	(4.2)	(7.2)		(7.2)
感染症	16	11	27		27
(%)	(17.6)	(22.9)	(19.4)		(19.4)
消化管出血		1	1		1
(%)		(2.1)	(0.7)		(0.7)
悪性腫瘍	15	6	21		21
(%)	(16.5)	(12.5)	(15.1)		(15.1)
悪液質/尿毒症	4	3	7		7
(%)	(4.4)	(6.3)	(5.0)		(5.0)
心筋梗塞	5	1	6		6
(%)	(5.5)	(2.1)	(4.3)		(4.3)
カリウム中毒/頓死	4	1	5		5
(%)	(4.4)	(2.1)	(3.6)		(3.6)
肝硬変症					
(%)					
自殺/拒否					
(%)					
腸閉塞	1	1	2		2
(%)	(1.1)	(2.1)	(1.4)		(1.4)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	2		2		2
(%)	(2.2)		(1.4)		(1.4)
その他	10	8	18		18
(%)	(11.0)	(16.7)	(12.9)		(12.9)
不明	7	2	9		9
(%)	(7.7)	(4.2)	(6.5)		(6.5)
合計	91	48	139		139
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	91	48	139		139

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0218##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査