

表 284 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(岡山県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	83	39	122		122
(%)	(24.6)	(23.8)	(24.3)		(24.3)
脳血管障害	24	12	36		36
(%)	(7.1)	(7.3)	(7.2)		(7.2)
感染症	91	42	133		133
(%)	(26.9)	(25.6)	(26.5)		(26.5)
消化管出血	8	1	9		9
(%)	(2.4)	(0.6)	(1.8)		(1.8)
悪性腫瘍	32	10	42		42
(%)	(9.5)	(6.1)	(8.4)		(8.4)
悪液質/尿毒症	8	8	16		16
(%)	(2.4)	(4.9)	(3.2)		(3.2)
心筋梗塞	15	3	18		18
(%)	(4.4)	(1.8)	(3.6)		(3.6)
カリウム中毒/頓死	4	5	9		9
(%)	(1.2)	(3.0)	(1.8)		(1.8)
肝硬変症	1		1		1
(%)	(0.3)		(0.2)		(0.2)
自殺/拒否	3		3		3
(%)	(0.9)		(0.6)		(0.6)
腸閉塞	2	1	3		3
(%)	(0.6)	(0.6)	(0.6)		(0.6)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	3	1	4		4
(%)	(0.9)	(0.6)	(0.8)		(0.8)
その他	47	32	79		79
(%)	(13.9)	(19.5)	(15.7)		(15.7)
不明	17	10	27		27
(%)	(5.0)	(6.1)	(5.4)		(5.4)
合計	338	164	502		502
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	338	164	502		502

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0219##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査