

表 286 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(山口県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	58	40	98		98
(%)	(23.1)	(30.5)	(25.7)		(25.7)
脳血管障害	13	14	27		27
(%)	(5.2)	(10.7)	(7.1)		(7.1)
感染症	59	29	88		88
(%)	(23.5)	(22.1)	(23.0)		(23.0)
消化管出血	1	4	5		5
(%)	(0.4)	(3.1)	(1.3)		(1.3)
悪性腫瘍	27	10	37		37
(%)	(10.8)	(7.6)	(9.7)		(9.7)
悪液質/尿毒症	7	5	12		12
(%)	(2.8)	(3.8)	(3.1)		(3.1)
心筋梗塞	21	5	26		26
(%)	(8.4)	(3.8)	(6.8)		(6.8)
カリウム中毒/頓死	5	4	9		9
(%)	(2.0)	(3.1)	(2.4)		(2.4)
肝硬変症	2		2		2
(%)	(0.8)		(0.5)		(0.5)
自殺/拒否	3	1	4		4
(%)	(1.2)	(0.8)	(1.0)		(1.0)
腸閉塞	4	4	8		8
(%)	(1.6)	(3.1)	(2.1)		(2.1)
肺血栓/肺塞栓	1		1		1
(%)	(0.4)		(0.3)		(0.3)
災害・事故死	2		2		2
(%)	(0.8)		(0.5)		(0.5)
その他	24	9	33		33
(%)	(9.6)	(6.9)	(8.6)		(8.6)
不明	24	6	30		30
(%)	(9.6)	(4.6)	(7.9)		(7.9)
合計	251	131	382		382
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	251	131	382		382

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0221##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査