

表 287 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (徳島県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全 (%)	67 (30.2)	40 (39.6)	107 (33.1)		107 (33.1)
脳血管障害 (%)	15 (6.8)	8 (7.9)	23 (7.1)		23 (7.1)
感染症 (%)	44 (19.8)	24 (23.8)	68 (21.1)		68 (21.1)
消化管出血 (%)	1 (0.5)	1 (1.0)	2 (0.6)		2 (0.6)
悪性腫瘍 (%)	20 (9.0)	5 (5.0)	25 (7.7)		25 (7.7)
悪液質/尿毒症 (%)	15 (6.8)	6 (5.9)	21 (6.5)		21 (6.5)
心筋梗塞 (%)	4 (1.8)	1 (1.0)	5 (1.5)		5 (1.5)
カリウム中毒/頓死 (%)	5 (2.3)	4 (4.0)	9 (2.8)		9 (2.8)
肝硬変症 (%)	4 (1.8)	2 (2.0)	6 (1.9)		6 (1.9)
自殺/拒否 (%)					
腸閉塞 (%)	6 (2.7)	3 (3.0)	9 (2.8)		9 (2.8)
肺血栓/肺塞栓 (%)					
災害・事故死 (%)	4 (1.8)	1 (1.0)	5 (1.5)		5 (1.5)
その他 (%)	16 (7.2)	2 (2.0)	18 (5.6)		18 (5.6)
不明 (%)	21 (9.5)	4 (4.0)	25 (7.7)		25 (7.7)
合計 (%)	222 (100.0)	101 (100.0)	323 (100.0)		323 (100.0)
記載なし					
総計	222	101	323		323

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

#A0222##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査