

表 288 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(香川県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	62	47	109		109
(%)	(30.5)	(40.9)	(34.3)		(34.3)
脳血管障害	10	11	21		21
(%)	(4.9)	(9.6)	(6.6)		(6.6)
感染症	46	22	68		68
(%)	(22.7)	(19.1)	(21.4)		(21.4)
消化管出血	3	3	6		6
(%)	(1.5)	(2.6)	(1.9)		(1.9)
悪性腫瘍	23	5	28		28
(%)	(11.3)	(4.3)	(8.8)		(8.8)
悪液質/尿毒症	10	3	13		13
(%)	(4.9)	(2.6)	(4.1)		(4.1)
心筋梗塞	4		4		4
(%)	(2.0)		(1.3)		(1.3)
カリウム中毒/頓死	2		2		2
(%)	(1.0)		(0.6)		(0.6)
肝硬変症	3		3		3
(%)	(1.5)		(0.9)		(0.9)
自殺/拒否	2		2		2
(%)	(1.0)		(0.6)		(0.6)
腸閉塞	3	2	5		5
(%)	(1.5)	(1.7)	(1.6)		(1.6)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死					
(%)					
その他	15	13	28		28
(%)	(7.4)	(11.3)	(8.8)		(8.8)
不明	20	9	29		29
(%)	(9.9)	(7.8)	(9.1)		(9.1)
合計	203	115	318		318
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	203	115	318		318

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0223##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査