

表 289 2016年死亡患者死亡原因分類 (性別との関係) (愛媛県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	79	44	123		123
(%)	(31.1)	(32.8)	(31.7)		(31.7)
脳血管障害	14	12	26		26
(%)	(5.5)	(9.0)	(6.7)		(6.7)
感染症	49	21	70		70
(%)	(19.3)	(15.7)	(18.0)		(18.0)
消化管出血	1	3	4		4
(%)	(0.4)	(2.2)	(1.0)		(1.0)
悪性腫瘍	28	4	32		32
(%)	(11.0)	(3.0)	(8.2)		(8.2)
悪液質/尿毒症	12	4	16		16
(%)	(4.7)	(3.0)	(4.1)		(4.1)
心筋梗塞	12	7	19		19
(%)	(4.7)	(5.2)	(4.9)		(4.9)
カリウム中毒/頓死	5	2	7		7
(%)	(2.0)	(1.5)	(1.8)		(1.8)
肝硬変症	2	2	4		4
(%)	(0.8)	(1.5)	(1.0)		(1.0)
自殺/拒否	1	5	6		6
(%)	(0.4)	(3.7)	(1.5)		(1.5)
腸閉塞	4	1	5		5
(%)	(1.6)	(0.7)	(1.3)		(1.3)
肺血栓/肺塞栓	2		2		2
(%)	(0.8)		(0.5)		(0.5)
災害・事故死		1	1		1
(%)		(0.7)	(0.3)		(0.3)
その他	22	13	35		35
(%)	(8.7)	(9.7)	(9.0)		(9.0)
不明	23	15	38		38
(%)	(9.1)	(11.2)	(9.8)		(9.8)
合計	254	134	388		388
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	254	134	388		388

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0224##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査