

表 290 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(高知県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	44	21	65		65
(%)	(29.7)	(28.0)	(29.1)		(29.1)
脳血管障害	6	6	12		12
(%)	(4.1)	(8.0)	(5.4)		(5.4)
感染症	30	20	50		50
(%)	(20.3)	(26.7)	(22.4)		(22.4)
消化管出血	1		1		1
(%)	(0.7)		(0.4)		(0.4)
悪性腫瘍	19	7	26		26
(%)	(12.8)	(9.3)	(11.7)		(11.7)
悪液質/尿毒症	4	1	5		5
(%)	(2.7)	(1.3)	(2.2)		(2.2)
心筋梗塞	7	3	10		10
(%)	(4.7)	(4.0)	(4.5)		(4.5)
カリウム中毒/頓死	4		4		4
(%)	(2.7)		(1.8)		(1.8)
肝硬変症	3		3		3
(%)	(2.0)		(1.3)		(1.3)
自殺/拒否					
(%)					
腸閉塞		4	4		4
(%)		(5.3)	(1.8)		(1.8)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死					
(%)					
その他	17	8	25		25
(%)	(11.5)	(10.7)	(11.2)		(11.2)
不明	13	5	18		18
(%)	(8.8)	(6.7)	(8.1)		(8.1)
合計	148	75	223		223
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	148	75	223		223

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0225##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査