

表 291 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(福岡県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	113	74	187		187
(%)	(14.5)	(16.7)	(15.3)		(15.3)
脳血管障害	41	22	63		63
(%)	(5.2)	(5.0)	(5.2)		(5.2)
感染症	210	111	321		321
(%)	(26.9)	(25.1)	(26.2)		(26.2)
消化管出血	2	8	10		10
(%)	(0.3)	(1.8)	(0.8)		(0.8)
悪性腫瘍	94	55	149		149
(%)	(12.0)	(12.4)	(12.2)		(12.2)
悪液質/尿毒症	24	21	45		45
(%)	(3.1)	(4.8)	(3.7)		(3.7)
心筋梗塞	30	16	46		46
(%)	(3.8)	(3.6)	(3.8)		(3.8)
カリウム中毒/頓死	18	8	26		26
(%)	(2.3)	(1.8)	(2.1)		(2.1)
肝硬変症	10	5	15		15
(%)	(1.3)	(1.1)	(1.2)		(1.2)
自殺/拒否	5	1	6		6
(%)	(0.6)	(0.2)	(0.5)		(0.5)
腸閉塞	5	5	10		10
(%)	(0.6)	(1.1)	(0.8)		(0.8)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	7	3	10		10
(%)	(0.9)	(0.7)	(0.8)		(0.8)
その他	112	65	177		177
(%)	(14.3)	(14.7)	(14.5)		(14.5)
不明	110	48	158		158
(%)	(14.1)	(10.9)	(12.9)		(12.9)
合計	781	442	1,223		1,223
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	781	442	1,223		1,223

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0226##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査