

表 292 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (佐賀県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全 (%)	31 (24.8)	26 (26.0)	57 (25.3)		57 (25.3)
脳血管障害 (%)	12 (9.6)	9 (9.0)	21 (9.3)		21 (9.3)
感染症 (%)	25 (20.0)	23 (23.0)	48 (21.3)		48 (21.3)
消化管出血 (%)		1 (1.0)	1 (0.4)		1 (0.4)
悪性腫瘍 (%)	12 (9.6)	7 (7.0)	19 (8.4)		19 (8.4)
悪液質/尿毒症 (%)	3 (2.4)	3 (3.0)	6 (2.7)		6 (2.7)
心筋梗塞 (%)	5 (4.0)	2 (2.0)	7 (3.1)		7 (3.1)
カリウム中毒/頓死 (%)	2 (1.6)	2 (2.0)	4 (1.8)		4 (1.8)
肝硬変症 (%)					
自殺/拒否 (%)					
腸閉塞 (%)	2 (1.6)		2 (0.9)		2 (0.9)
肺血栓/肺塞栓 (%)					
災害・事故死 (%)	1 (0.8)	1 (1.0)	2 (0.9)		2 (0.9)
その他 (%)	19 (15.2)	17 (17.0)	36 (16.0)		36 (16.0)
不明 (%)	13 (10.4)	9 (9.0)	22 (9.8)		22 (9.8)
合計 (%)	125 (100.0)	100 (100.0)	225 (100.0)		225 (100.0)
記載なし					
総計	125	100	225		225

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

#A0227##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査