

表 293 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (長崎県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全 (%)	59 (25.1)	32 (24.4)	91 (24.9)		91 (24.9)
脳血管障害 (%)	22 (9.4)	11 (8.4)	33 (9.0)		33 (9.0)
感染症 (%)	56 (23.8)	40 (30.5)	96 (26.2)		96 (26.2)
消化管出血 (%)	5 (2.1)	2 (1.5)	7 (1.9)		7 (1.9)
悪性腫瘍 (%)	17 (7.2)	4 (3.1)	21 (5.7)		21 (5.7)
悪液質/尿毒症 (%)	12 (5.1)	5 (3.8)	17 (4.6)		17 (4.6)
心筋梗塞 (%)	10 (4.3)	2 (1.5)	12 (3.3)		12 (3.3)
カリウム中毒/頓死 (%)	6 (2.6)	2 (1.5)	8 (2.2)		8 (2.2)
肝硬変症 (%)	5 (2.1)		5 (1.4)		5 (1.4)
自殺/拒否 (%)		1 (0.8)	1 (0.3)		1 (0.3)
腸閉塞 (%)	4 (1.7)	1 (0.8)	5 (1.4)		5 (1.4)
肺血栓/肺塞栓 (%)					
災害・事故死 (%)					
その他 (%)	25 (10.6)	19 (14.5)	44 (12.0)		44 (12.0)
不明 (%)	14 (6.0)	12 (9.2)	26 (7.1)		26 (7.1)
合計 (%)	235 (100.0)	131 (100.0)	366 (100.0)		366 (100.0)
記載なし					
総計	235	131	366		366

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

##A0228##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査