

表 294 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (熊本県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全 (%)	72 (22.2)	57 (31.5)	129 (25.5)		129 (25.5)
脳血管障害 (%)	24 (7.4)	16 (8.8)	40 (7.9)		40 (7.9)
感染症 (%)	81 (24.9)	36 (19.9)	117 (23.1)		117 (23.1)
消化管出血 (%)	6 (1.8)	1 (0.6)	7 (1.4)		7 (1.4)
悪性腫瘍 (%)	30 (9.2)	16 (8.8)	46 (9.1)		46 (9.1)
悪液質/尿毒症 (%)	17 (5.2)	6 (3.3)	23 (4.5)		23 (4.5)
心筋梗塞 (%)	11 (3.4)	4 (2.2)	15 (3.0)		15 (3.0)
カリウム中毒/頓死 (%)	7 (2.2)	2 (1.1)	9 (1.8)		9 (1.8)
肝硬変症 (%)	6 (1.8)		6 (1.2)		6 (1.2)
自殺/拒否 (%)	1 (0.3)	1 (0.6)	2 (0.4)		2 (0.4)
腸閉塞 (%)	1 (0.3)	3 (1.7)	4 (0.8)		4 (0.8)
肺血栓/肺塞栓 (%)	3 (0.9)	1 (0.6)	4 (0.8)		4 (0.8)
災害・事故死 (%)	3 (0.9)	1 (0.6)	4 (0.8)		4 (0.8)
その他 (%)	40 (12.3)	15 (8.3)	55 (10.9)		55 (10.9)
不明 (%)	23 (7.1)	22 (12.2)	45 (8.9)		45 (8.9)
合計 (%)	325 (100.0)	181 (100.0)	506 (100.0)		506 (100.0)
記載なし					
総計	325	181	506		506

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0229##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査