

表 296 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(宮崎県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	55	34	89		89
(%)	(23.1)	(24.3)	(23.5)		(23.5)
脳血管障害	21	10	31		31
(%)	(8.8)	(7.1)	(8.2)		(8.2)
感染症	67	37	104		104
(%)	(28.2)	(26.4)	(27.5)		(27.5)
消化管出血	3		3		3
(%)	(1.3)		(0.8)		(0.8)
悪性腫瘍	29	15	44		44
(%)	(12.2)	(10.7)	(11.6)		(11.6)
悪液質/尿毒症	9	11	20		20
(%)	(3.8)	(7.9)	(5.3)		(5.3)
心筋梗塞	13	5	18		18
(%)	(5.5)	(3.6)	(4.8)		(4.8)
カリウム中毒/頓死	5	4	9		9
(%)	(2.1)	(2.9)	(2.4)		(2.4)
肝硬変症	2		2		2
(%)	(0.8)		(0.5)		(0.5)
自殺/拒否	4		4		4
(%)	(1.7)		(1.1)		(1.1)
腸閉塞	2	2	4		4
(%)	(0.8)	(1.4)	(1.1)		(1.1)
肺血栓/肺塞栓	1	1	2		2
(%)	(0.4)	(0.7)	(0.5)		(0.5)
災害・事故死	2	1	3		3
(%)	(0.8)	(0.7)	(0.8)		(0.8)
その他	15	13	28		28
(%)	(6.3)	(9.3)	(7.4)		(7.4)
不明	10	7	17		17
(%)	(4.2)	(5.0)	(4.5)		(4.5)
合計	238	140	378		378
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	238	140	378		378

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0231##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査