

表 297 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(鹿児島県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	91	51	142		142
(%)	(26.3)	(23.7)	(25.3)		(25.3)
脳血管障害	29	17	46		46
(%)	(8.4)	(7.9)	(8.2)		(8.2)
感染症	86	49	135		135
(%)	(24.9)	(22.8)	(24.1)		(24.1)
消化管出血	2	1	3		3
(%)	(0.6)	(0.5)	(0.5)		(0.5)
悪性腫瘍	29	9	38		38
(%)	(8.4)	(4.2)	(6.8)		(6.8)
悪液質/尿毒症	12	21	33		33
(%)	(3.5)	(9.8)	(5.9)		(5.9)
心筋梗塞	15	7	22		22
(%)	(4.3)	(3.3)	(3.9)		(3.9)
カリウム中毒/頓死	8	4	12		12
(%)	(2.3)	(1.9)	(2.1)		(2.1)
肝硬変症		1	1		1
(%)		(0.5)	(0.2)		(0.2)
自殺/拒否	5		5		5
(%)	(1.4)		(0.9)		(0.9)
腸閉塞	2	1	3		3
(%)	(0.6)	(0.5)	(0.5)		(0.5)
肺血栓/肺塞栓		1	1		1
(%)		(0.5)	(0.2)		(0.2)
災害・事故死	1	1	2		2
(%)	(0.3)	(0.5)	(0.4)		(0.4)
その他	49	41	90		90
(%)	(14.2)	(19.1)	(16.0)		(16.0)
不明	17	11	28		28
(%)	(4.9)	(5.1)	(5.0)		(5.0)
合計	346	215	561		561
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	346	215	561		561

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0232##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査