

表 298 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (沖縄県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	28	17	45		45
(%)	(12.7)	(13.3)	(12.9)		(12.9)
脳血管障害	19	10	29		29
(%)	(8.6)	(7.8)	(8.3)		(8.3)
感染症	71	41	112		112
(%)	(32.3)	(32.0)	(32.2)		(32.2)
消化管出血	3	3	6		6
(%)	(1.4)	(2.3)	(1.7)		(1.7)
悪性腫瘍	17	13	30		30
(%)	(7.7)	(10.2)	(8.6)		(8.6)
悪液質/尿毒症	9	9	18		18
(%)	(4.1)	(7.0)	(5.2)		(5.2)
心筋梗塞	11	1	12		12
(%)	(5.0)	(0.8)	(3.4)		(3.4)
カリウム中毒/頓死	6		6		6
(%)	(2.7)		(1.7)		(1.7)
肝硬変症	2		2		2
(%)	(0.9)		(0.6)		(0.6)
自殺/拒否	4	2	6		6
(%)	(1.8)	(1.6)	(1.7)		(1.7)
腸閉塞	1	1	2		2
(%)	(0.5)	(0.8)	(0.6)		(0.6)
肺血栓/肺塞栓		1	1		1
(%)		(0.8)	(0.3)		(0.3)
災害・事故死					
(%)					
その他	18	14	32		32
(%)	(8.2)	(10.9)	(9.2)		(9.2)
不明	31	16	47		47
(%)	(14.1)	(12.5)	(13.5)		(13.5)
合計	220	128	348		348
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	220	128	348		348

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0233##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査