

表 303 2016年死亡患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患＝慢性腎盂腎炎

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)										1 (50.0)	1 (10.0)	2 (20.0)	4 (28.6)	6 (24.0)	7 (21.9)	10 (27.0)	4 (11.4)	19 (47.5)	6 (42.9)	1 (100.0)	61 (27.4)			61 (27.4)	78.23	11.37
脳血管障害 (%)									1 (50.0)			1 (10.0)		2 (8.0)	2 (6.3)	1 (2.7)	1 (2.9)		1 (7.1)		9 (4.0)			9 (4.0)	70.00	14.59
感染症 (%)									1 (50.0)		1 (10.0)	1 (10.0)	1 (7.1)	2 (8.0)	9 (28.1)	16 (43.2)	9 (25.7)	8 (20.0)	3 (21.4)		51 (22.9)			51 (22.9)	77.35	9.50
消化管出血 (%)													1 (7.1)								1 (0.4)			1 (0.4)	61.00	
悪性腫瘍 (%)											4 (40.0)	1 (10.0)	4 (28.6)	6 (24.0)	3 (9.4)	5 (13.5)	6 (17.1)	5 (12.5)	2 (14.3)		36 (16.1)			36 (16.1)	73.08	11.78
悪液質/尿毒症 (%)													1 (7.1)					2 (5.7)	1 (2.5)		4 (1.8)			4 (1.8)	78.50	10.47
心筋梗塞 (%)												1 (10.0)	1 (7.1)					2 (5.7)	1 (2.5)	1 (7.1)	6 (2.7)			6 (2.7)	76.50	13.97
カリウム中毒/鎮死 (%)								1 (100.0)			1 (10.0)	1 (10.0)	1 (7.1)	1 (4.0)	2 (6.3)	1 (2.7)					8 (3.6)			8 (3.6)	62.38	14.42
肝硬変症 (%)											1 (10.0)				1 (3.1)	1 (2.7)			1 (2.5)		4 (1.8)			4 (1.8)	72.25	15.78
自殺/拒否 (%)												1 (10.0)	1 (7.1)								2 (0.9)			2 (0.9)	59.00	2.83
腸閉塞 (%)																1 (2.7)					1 (0.4)			1 (0.4)	77.00	
肺血栓/肺塞栓 (%)														1 (4.0)							1 (0.4)			1 (0.4)	69.00	
災害・事故死 (%)																1 (2.7)	1 (2.9)				2 (0.9)			2 (0.9)	79.50	0.71
その他 (%)											2 (20.0)			5 (20.0)	2 (6.3)	1 (2.7)	5 (14.3)	1 (2.5)			16 (7.2)			16 (7.2)	72.50	10.30
不明 (%)										1 (50.0)		2 (20.0)		2 (8.0)	6 (18.8)		5 (14.3)	4 (10.0)	1 (7.1)		21 (9.4)			21 (9.4)	75.43	11.72
合計 (%)								1 (100.0)	2 (100.0)	2 (100.0)	10 (100.0)	10 (100.0)	14 (100.0)	25 (100.0)	32 (100.0)	37 (100.0)	35 (100.0)	40 (100.0)	14 (100.0)	1 (100.0)	223 (100.0)			223 (100.0)	75.19	11.67
記載なし																										
総計								1	2	2	10	10	14	25	32	37	35	40	14	1	223			223	75.19	11.67

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
##A0Z36##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査